


Текущее состояние и тенденции расширения масштабов профилактики и лечения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии

Павленко В.Н., Республиканский специалист
по профилактике и борьбе со СПИДом

СТРАТЕГИЯ ЮНЭЙДС: ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ



**Стратегический приоритет:
профилактика ВИЧ среди ключевых групп**

**Стратегический приоритет:
Тестирование и лечение**


**Стратегический приоритет:
предотвращение ПМР**

**Стратегический приоритет:
Права человека и гендерное
равенство в борьбе с ВИЧ**

**Стратегический приоритет:
Устойчивые системы
здравоохранения**



Лица, живущие с ВИЧ



Источник: Оценки ЮНЭЙДС, 2017

Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.



Тенденция новых случаев ВИЧ в регионе и глобально (оценки)

ВЕЦА


**Прирост с
2010**

30 %

Глобально

**Снижение с
2010**

18 %



Источник: Оценки ЮНЭЙДС, 2017

Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.





СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 2016 Г. ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН
НЬЮ-ЙОРК | 8–10 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Организация Объединенных Наций

A/70/L.52



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited

7 June 2016

Russian

Original: English

19: выражаем глубокую обеспокоенность по поводу того, что ВИЧ и СПИД затрагивают все регионы мира, что после Африки к югу от Сахары Карибский бассейн является вторым по масштабам распространения этой инфекции регионом и что в странах Восточной Европы и Центральной Азии число новых случаев инфицирования ВИЧ растет, и отмечаем, что 90 процентов новых случаев инфицирования ВИЧ приходится всего на 35 стран;


Состояние эпидемии ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии

- Число людей, живущих с ВИЧ, составило **1,4** [1,3–1,6] миллиона.
- По оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило **130 000** [120 000–150 000].
 - Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выросло на **30%** в период с 2010 по 2017 годы
- **33 000** [24 000– 40 000] человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней.
- Показатель охвата лечением среди людей, живущих с ВИЧ, составил всего **36%** [34–33%].

Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.




Динамика регистрации новых случаев ВИЧ в странах региона (2010,2015,2017)



Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.




Охват тестированием ВИЧ (%, все население, 2016-2017)



Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.




ВИЧ тестирование в странах ЕС и ВЕЦА (число ВИЧ тестов на 1000 населения)




Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.



Индекс заражения ВИЧ – новые случаи в пересчете на 100 000 чел.



Источник – Отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 2018 г.




* Данные доступны только из Азии и Тихоокеанского региона, стран Карибского бассейна и Латинской Америки. За редким исключением в основном данные предоставлялись женщинами-трансгендерами из секс-индустрии, однако анализ охватывает всех женщин-трансгендеров.

† У лиц данной категории не отмечалось никакого поведения, связанного с риском ВИЧ.


Источник: Специальный анализ UNAIDS 2018

Охват тестированием ВИЧ ключевых групп (2017,%)



Zero new HIV infections.
Zero discrimination.
Zero AIDS-related deaths.

Знание о своем статусе ВИЧ, охват лечением и подавление вирусной нагрузки среди ЛЖВ, 2017¹




* Каскад Западной и Центральной Европы и Северной Америки за 2016.

Источник: специальный анализ UNAIDS, 2018; для дополнительной информации смотрите приложение о методах.



Барьеры


- стигма и дискриминация
- неудобная организация услуг
- длительность процедуры
- самостигматизация
- страх позитивного результата
- отсутствие поддержки
- страх раскрытия



..

- дружественное пространство
- конфиденциальность
- удобное время работы
- быстрые тесты
- равные консультанты
- поддержка и сопровождение
- детальные консультации
- отсутствие предубеждений и ограничений

Решения



- 
- Рост охвата лечением за последние 3 года
 - Внедрение стратегии TEST and TREAT
 - Сокращение срока начала лечения от момента диагноза
 - Переход на комбинированные препараты
 - Повышение приверженности к АРВ

Охват населения по результатам закупа через международные организации



СК-ФАРМАЦИЯ


За период с 2014 г. цена на ARV препараты первой линии в Республике Казахстан снижена в 39 раз

Впервые с 2019 г. внедрена новая схема лечения ВИЧ с использованием современных трех антиретровирусных препаратов


Впервые в 2018 г. закуплено инновационное лекарство СОФОСБУВИР. Препарат закуплен **НА 91% ДЕШЕВЛЕ**.

Впервые в 2019 г. произведен закуп современных ПТП для диагностики лечения ТБ с множественной лекарственной устойчивостью

Закуп ARV препарата (1-ой линии Тенофовир-Эмтрицитаб ин-Эфавиренз)



Закуп лекарств для лечения Гепатита С (Софосбувир)



Закуп противотуберкулезных препаратов (М/ШЛУ)*




За счет закупа с 2019 года современных противотуберкулезных препаратов для лечения ТБ с М/ШЛУ через **СТОП-ТБ** охват лечения пациентов увеличится до **100%** (в 2017 г – 25% охвата современными противотуберкулезными препаратами)
 Закуп картриджей Xpert® позволит сократить время диагностики по выявлению туберкулеза и его статус с 1-2 мес. до 2 часов.

Тенденции новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослых (15 лет и старше) по странам, 2010-2017

Снижение на 50% или больше	Камбоджа, Монголия *, Непал.
Снижение на 25- <50%	Армения , Австрия, Багамские Острова, Эсватини, Франция, Кения, Кыргызстан , Малави, Мавритания, Мьянма, Нидерланды, Португалия, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Тринидад и Тобаго, Уганда, Зимбабве.
Снижение на 5- <25%	Албания *, Барбадос, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, бывшая югославская Республика Македония, Доминиканская Республика, Республика Корея, Сальвадор, Объединенная Республика Танзания, Объединенная Республика Танзания, Объединенная Республика Танзания, Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Монако, Замбия.
Изменение на +/- <5%	Ангола, Боливия, Бразилия, Чад, Коморские Острова *, Эквадор, Габон, Гана, Гвинея, Италия, Япония, Нигерия, Парагвай, Республика Молдова , Южный Судан, Таджикистан .
Повышение на 5- <25%	Аргентина, Австралия, Азербайджан , Бахрейн *, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Кабо-Верде, Конго, Кот-д'Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Гондурас, Либерия, Малайзия, Мали, Мексика, Панама, Папуа, Новая Гвинея, Словения *, Судан, Тунис.
Повышение на 25- <49%	Алжир, Беларусь , Буркина-Фасо, Бурунди, Казахстан , Коста-Рика, Кипр *, Эритрея, Эфиопия, Греция, Люксембург *, Пакистан, Российская Федерация , Суринам.
Повышение на 50% или больше	Чили, Чешская Республика, Египет, Венгрия, Литва, Кувейт *, Мадагаскар, Черногория *, Филиппины, Катар *, Словакия, бывшая югославская Республика Македония *, Узбекистан .

* Страны с менее 100 новых случаев инфицирования среди взрослого населения.

Источник: оценки UNAIDS 2018.




- Профилактика вертикальной передачи ВИЧ

Получили сертификат ВОЗ - Армения и Молдова, подали заявки - Беларусь и Казахстан, подготовка заявок – Кыргызстан, Россия, Таджикистан

- Изменение эпидемической ситуации в уязвимых группах, снижение доли ЛУИН, рост МСМ и РКС

- Сокращение международной донорской помощи при повышении доступности госсоцзаказа

- 
- первичная медико-санитарная помощь
 - интеграция различных специализированных медицинских служб
 - включение услуг в области ВИЧ в базовый пакет услуг здравоохранения
 - разработка механизмов государственной поддержки услуг не входящих в базовый пакет
 - программы поддержки ключевых групп населения, в особенности сетей НПО людей, живущих с ВИЧ
 - активное противодействие стигме и дискриминации

Статистические данные с 1987 года по настоящее время в Донецкой Народной Республике



На диспансерном учете состоит 17289 человек

В том числе с диагнозом СПИД - 5143 человека

Оценочные данные

40 - 60 тыс. ЛЖВ

Еженедельно - 50 (!) новых случаев ВИЧ-инфекции


Ежедневно - новых случаев СПИДа - 2

случаев смерти среди ВИЧ пациентов - 2

случаев смерти у пациентов со СПИД - 1


Тенденции развития эпидпроцесса ВИЧ в Донецкой Народной Республике, 2019 г.

Динамика изменения путей передачи



— парентеральный (38,61%)
— половой (57,63%)
— от матери к ребенку (1,28%)
— пути передачи не установлен (2,47%)


Соотношение 1:4




Соотношение 1:1,1




Удельный вес людей, которые живут с ВИЧ (ЛЖВ)




Удельный вес подростков (15-17 лет)





Возрастная структура ВИЧ-инфекции 2016-2018гг.




Заболеваемость ВИЧ/СПИДом



Охват АРТ



Охват скрининговым обследованием на ВИЧ



■ Общая выявляемость %

◆ Выявлено положительных результатов

90-90-90

90-90-90 – Амбициозные цели ВОЗ, чтобы преодолеть эпидемию СПИДа

90%

всех



ЛЖВ знают свой ВИЧ-статус

90%

всех



ЛЖВ получают АРТ

90%

всех



ЛЖВ, получающие АРТ, имеют подавление вирусной нагрузки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ