



**ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького**  
**Кафедра детских инфекционных болезней**

# **Болезнь кошачьих царапин** **(фелиноз, доброкачественный** **лимфоретикулез).**

**Кучеренко Н.П., Коваленко Т.И.,**  
**Гончарова Л.А., Медведева В.В., Голосной Э.В.**

**г. Донецк, 2020 г.**



**Это острое инфекционное заболевание, которое развивается вследствие подпадания возбудителя – бактерии Бартонелла.**



**Её носителем являются домашние животные – собаки, кошки, а также грызуны, обезьяны и птицы – их перья и когти, мелкие щепки.**

Болезнь кошачьих царапин у детей встречается и диагностируется гораздо чаще, чем у взрослых.

Домашняя кошка, в частности котята, является основным источником.

Бактерия-возбудитель попадает в человеческий организм через кожу при укусе, царапинах, ослюнении.

**Через несколько суток на поврежденном месте возникает плотная папула, в части случаев – изъязвленная и покрытая корочкой. Из места повреждения лимфогенными путями бактерия поступает в регионарные лимфатические узлы с развитием аденита. Инкубационный период длится от 10 до 30 суток, реже – 2 месяца.**

Заболевание начинается остро: резко повышается температура тела до 38 – 39° С, наблюдается легкое недомогание, происходит увеличение регионарного лимфатического узла или группы лимфоузлов, увеличение печени, селезенки и экзантемой.

Инфицированию подвержены лимфатические узлы в области:

- подмышшек;
- шеи;
- паха, бедра;
- под челюстью;
- перед ушной раковиной;
- под или над ключицей.



## **Клинические проявления:**

Лихорадка, недомогание, головная боль и анорексия могут сопровождать увеличение лимфатических узлов.



# Выделяют две формы фелиноза:

## 1. Типичная форма.

Поражение кожи и регионарных лимфатических узлов, чаще всего шейных, подмышечных, локтевых, паховых. Лимфоузел может вырасти до 12 см.

Могут возникать симптомы интоксикации:

- головная боль;
- повышение температуры;
- сонливость;
- повышенная утомляемость;
- отсутствие аппетита;
- боль в мышцах;
- повышенное потоотделение.



## **2. Атипичная форма.**

- лихорадка;**
- появление язв;**
- нагноение царапин или укусов;**
- возникновение шрамов после заживления.**

Эта форма чаще встречается у детей и пожилых людей.

**Лечение болезни кошачьей царапины**

**Больной получает симптоматическое лечение.**

**При легкой форме - лечение обычно не требуется, так как симптомы исчезают сами по себе через 2 недели.**

## **Комплексная терапия:**

**включает в себя лечение в стационаре с назначением:**

- антибиотиков (эритромицин, азитромицин, офлоксацин, ципрофлоксацин);**
- сосудосуживающих препаратов;**
- болеутоляющих средств;**
- дезинфекции пораженных мест специальными растворами.**

**При своевременной и адекватной  
терапии прогноз лечения  
благоприятный.**

**Происходит постепенное  
выздоровление пациента и  
склерозирование пораженного  
лимфоузла.**

