

The background is an abstract, textured composition of soft, muted colors including light blue, beige, and pale pink. It features various textures such as fine white lines, small brown speckles, and larger, faint circular patterns, giving it a painterly or watercolor-like appearance.

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького

# Особенности формирования рисковых форм поведения у молодежи

*Киосев Н. В.*

# Цель работы

- определение распространенности употребления психически активных веществ (ПАВ) студентами младших курсов при нарушениях и расстройствах адаптации

# Материал и методы

- проведен скрининг психического и аддиктивного статусов у 208 студентов: 136 девушек (65,4%) и 72 юноши (34,6%) 1-3 курсов ГОО ВПО ДОН НМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО в возрасте от 17 лет до 21 года.
- Использован клинико-anamнестический, клинико-психопатологический, психодиагностический методы, система AUDIT – подобных тестов

# Материал и методы

- На основании наличия признаков психологического дистресса и сопутствующих психопатологических симптомов, обследуемый контингент распределен на 3 группы, согласно диагностическим критериям МКБ-10.
- Практически здоровые студенты составили группу 1.
- Лица с признаками нарушения адаптации вошли в группу 2.
- Из студентов с признаками расстройств адаптации была сформирована группа 3

# Результаты

- Среди всех обследованных ( $n=208$ ) выявлено 83,2% (173/208) студентов, которые имели опыт употребления ПАВ, преимущественно напитки со слабым содержанием алкоголя – пиво и табакокурение, девушки 59,6% (124/208); юноши 21,2% (44/208). Распространенность употребления ПАВ среди студентов младших курсов среди всех обследованных ( $n=208$ ): доля от девушек – 85,3% (116/136), доля от юношей – 70,8% (51/72).

# Результаты

- Большая часть обследованных при приеме различных ПАВ находилась преимущественно в зоне относительно «безопасного употребления» (1-7 баллов) или «опасного употребления» (8-15 баллов), но еще без наступления вредных последствий или формирования состояний зависимости, за исключением табачной.

# Результаты

- Установлено, что у практически здоровых студентов (группа 1) и у студентов с признаками расстройств адаптации (группа 3) в структуре мотивов, побуждающих молодых людей употреблять ПАВ, в тройку доминирующих входят: на 1м месте – «Влияние друзей и компании» - 56%; субмиссивные мотивы в группе 1 и 65% соответственно в группе 2.
- На 2м месте у практически здоровых студентов – «Стремление к удовольствию, желание почувствовать необычные ощущения» - 44%; гедонистические мотивы, у студентов с признаками расстройств адаптации – «Стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей, заглушить их» 56% - атарактические мотивы.
- На 3м месте у молодежи группы 1 – «Отсутствие внешнего контроля взрослых» - 32%; субмиссивные мотивы, у группы 3 – «Стремление к удовольствию, желание почувствовать необычные ощущения» 36% - гедонистические мотивы

# Выводы

- Таким образом, в молодежной среде присутствует риск формирования зависимости и инфицирования социально - опасными болезнями, что необходимо учитывать при проведении информационно-образовательных мероприятий.

-