

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
ФИПО

Особенности лечения сифилиса у беременных

доц. Тахташов И. Р.

г.Донецк
10.02.2021 г.

Актуальность темы

В настоящее время в структуре заболеваемости сифилисом отмечается преобладание женщин фертильного возраста, что создает прецеденты для возможного трансплацентарного пути передачи болезни.

Выявление сифилиса перестало играть роль медицинского показания для прерывания беременности.

Решение о сохранении или прерывании беременности принимает женщина.

Роль врача состоит в проведении своевременного адекватного лечения и оказании психологической поддержки беременной.

Этапность лечения беременных

1-й этап:

Специфическое лечение беременных вне зависимости от сроков гестации проводят бензилпенициллина натриевой солью, новокаиновой солью пенициллина

2-й этап :

Профилактическое лечение беременных проводится начиная с 20 недели беременности, но при поздно начатом специфическом лечении - непосредственно вслед за ним

Препараты для лечения сифилиса у беременных

Бензилпенициллин — основной препарат для лечения сифилиса у беременных. Проникает через гематоплацентарный и гематоэнцефалический барьеры в трепонемотических концентрациях

Препараты для лечения сифилиса у беременных при непереносимости пенициллина

Беременным с непереносимостью пенициллина показаны:

- цефтриаксон
- полусинтетические пенициллины

Противопоказаны

Тетрациклин

Доксициклин

так как образуют нерастворимые комплексы с кальцием и откладываются в костном скелете, плохо проникает через гематоэнцефалический барьер

Эритромицин

не проникает через гематоплацентарный барьер.

Азитромицин

плохо проникают через гематоэнцефалический барьер.

Профилактическое лечение для предупреждения врождённого сифилиса

проводится

Беременным, лечившимся по поводу сифилиса до беременности, но у которых в нетрепонемных серологических тестах сохраняется позитивность.

Беременным, которым специфическое лечение проводилось во время беременности.

Профилактика врожденного сифилиса осуществляется антенатально и постнатально

Антенатальная профилактика включает:

- полноценное лечение больных сифилисом
- после лечения все пациенты находятся на учете у врача-дерматовенеролога с обязательным прохождением КСК
- беременным проводится обязательное 3-х кратное исследование крови на КСР

Профилактика врожденного сифилиса осуществляется антенатально и постнатально

Постнатальная профилактика врожденного сифилиса включает:

- профилактическое лечение детей.

Спасибо за внимание