**ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ И
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ:
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ**

Доцент, к.мед.н Шпилевая Н.И

ОСТЕОПОРОЗ : развитие наших представлений за последние 50 лет

- Распространенность ОП - 19%(1950г.) и 30-50% (2000г.) до 50-70% (2020г.)
- Рентгенография и денситометрия, микрофокусная КТ, биопсия гребня ПК
 - Профилактика ! переломов
 - ГЗТ, бисфосфонаты и
- Препараты для лечения остеопороза, способные регенерировать костную ткань

T.W.ONeil. Looking back: development in our underst. of...osteoporosis over last 50 years/ Rheumatology 2005. -44 (Suppl)

2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis

Прогрессирующая потеря костной ткани у женщин старше 50 лет

до 30% костной массы

- ❖ Рентгенографическая диагностика
- ❖ Радиоизотопные методы исследования
- ❖ Количественные методы определения плотности костной ткани: фотонная абсорбциометрия,
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
- ❖ Количественная компьютерная томография
- ❖ Ультразвуковая костная денситометрия
- ❖ Лабораторная диагностика

- ❖ В настоящее время применяется двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA)
- ❖ Костная масса оценивается по содержанию минералов на единицу площади кости (МПК, г/см²), а также в процентном соотношении к нормативным показателям у людей соответствующего возраста и пола.

Минеральная плотность костной ткани МПК

Норма	< 1 SD
Остеопения	1-2.5 SD
Остеопороз	> 2.5 SD
Тяжелый остеопороз	> 2.5 SD + перелом(ы)

Scan Information:

Scan Date: 27 May 2009 ID: A0527090F
 Scan Type: x Lumbar Spine
 Analysis: 27 May 2009 11:09 Version 12.6:3
 Lumbar Spine
 Operator: MB
 Model: Discovery A (S/N 82861)
 Comment:

DXA Results Summary:

Region	Area (cm ²)	BMC (g)	BMD (g/cm ³)	T-score
L1	12.50	8.08	0.647	-2.5
L2	14.41	10.93	0.758	-2.5
L3	16.15	12.97	0.803	-2.6
L4	18.51	15.82	0.855	-2.4
Total	61.56	47.80	0.776	-2.5

Total BMD CV 1.0%, ACF = 1.035, BCF = 1.024, TH = 6.193
 WHO Classification: Osteoporosis
 Fracture Risk: High

T-score vs. White Female, Z-score vs. White Female. Source: Hologic

Scan Information:

Scan Date: 25 February 2009 ID: A02250908
 Scan Type: a Left Hip
 Analysis: 25 February 2009 09:07 Version 12.6:3
 Left Hip
 Operator: MB
 Model: Discovery A (S/N 82861)
 Comment:

DXA Results Summary:

Region	Area (cm ²)	BMC (g)	BMD (g/cm ³)	T-score	Z-score
Neck	5.35	3.07	0.573	-2.6	-1.1
Troch	12.66	6.87	0.543	-1.6	-0.1
Inter	19.35	16.68	0.862	-1.5	-0.1
Total	37.36	26.62	0.713	-1.9	-1.1
Ward's	1.04	0.48	0.457	-2.4	-0.1

Total BMD CV 1.0%, ACF = 1.035, BCF = 1.024, TH = 3.565
 WHO Classification: Osteoporosis
 Fracture Risk: High

T-score vs. White Female, Z-score vs. White Female. Source: Hologic

Physician's Comment:

Physician's Comment:

У женщин в пременопаузе:

- ❖ используется Z-критерий
- ❖ **снижение костной массы диагностируется при Z- критерии $<$ или $= 2.0$**
- ❖ женщин в пременопаузе при диагностике остеопороза нельзя основываться только на данных МПК, необходимо учитывать клиническую картину заболевания

- ❑ **Микрофокусная компьютерная томография** (неинвазивное изучение микроархитектуры кости с высокой степенью разрешения – дистальный отдел большеберцовой кости, шейка бедренной кости, интертрохантерный промежуток, толщина бедра)
- ❑ **Биопсия гребня подвздошной кости – с проведением гистоморфометрии** (архитектура, костное ремоделирование, минерализация кости)

- Вычисляются размеры высоты переднего (h_a), заднего (h_p) и среднего (h_m) отделов тел позвонков на боковых рентгенограммах с Th4-L4.
- Уменьшение соотношения h_a/h_p – клиновидная деформация; h_p/h_m – двояковогнутая; h_a/h_p , h_m/h_p , h_p/h_{p1} – компрессионная.
- Снижение размеров одной из высот на 15%-25% рассматривается как перелом

Скрининг МПК (денситометрия)

- ❖ проводится 1 раз в год при подборе терапии и 1 раз в 2 года - при снижении факторов риска и стабилизации/повышении МПК
- ❖ Более частое проведение DEXA может быть продиктовано клинической ситуацией

- ❖ Рентгенография позвоночника может проводиться
 - женщинам старше 65 и мужчинам старше 70 лет для диагностики переломов
 - постменопаузальным женщинам и мужчинам 50 лет и старше с низкоэнергетическими переломами
 - женщинам и мужчинам 30-69 лет для диагностики перелома при снижении роста более, чем на 4 см или на 1.5 см при длительном приеме ГК

Маркеры обмена костной ткани:

формирование кости -

- Остеокальцин
- Проколаген 1-го типа (N-конечный пропептид)

резорбция кости –

- С-телопептид колагена 1-го типа

показатели кальция – фосфорного обмена:

- Кальций ионизированный -1,12-1,32 ммоль/л
- Кальций общий (сывор.) -2,2-2,36 ммоль/л

2020 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОП **тактика**

- ❖ Снизить риск развития остеопороза (борьба с факторами риска!) и обусловленных ОП-переломов
- ❖ Рекомендовать диету, богатую фруктами и овощами, включающую достаточное поступление кальция (1000 мг в день для мужчин и женщин 50-70 лет и 1200 мг в день для женщин старше 51 и мужчин 71 года)
- ❖ Потребление витамина D должно составлять 800 -1000 мг в день после 50 лет
- ❖ Рекомендованы регулярные упражнения для сохранения нормальной массы тела и мышечного тонуса
- ❖ Снизить риск падений пожилых пациентов!
- ❖ Скрининг МПК (денситометрия)

2020 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОП **лечение**

- ❖ Начинать лечение при установленном диагнозе ОП (МПКТ-индекс < 2.5 DEXA)
- ❖ Начинать лечение у постменопаузальных мужчин и женщин старше 50 лет при наличии остеопении и высоком риске переломов бедра и позвоночника
- ❖ Рекомендованные препараты для лечения – бисфосфонаты (алендронат, ибандронат, ризендронат, золедронат), ралоксифен, ГЗТ, терипаратид, деносумаб (FDA, EIOF), стронция ранелат (EIOF)

2020 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОП **лечение**

- ❖ Женщинам моложе 60 лет в постменопаузе с целью профилактики остеопороза дополнительно к вышеперечисленному может назначаться **заместительная гормональная терапия** женскими половыми гормонами (ЗГТ) независимо от наличия климактерических симптомов при условии низкого риска сердечно-сосудистых осложнений
- ❖ Вопрос о назначении и длительности ЗГТ решается гинекологом индивидуально для каждой пациентки с учётом противопоказаний и возможного риска осложнений

Место глюкокортикоидных гормонов в современной ревматологической практике

- ❖ Ревматоидный артрит
- ❖ Системная красная волчанка
- ❖ Полимиозит
- ❖ Синдром Шегрена
- ❖ Системные васкулиты
- ❖ Системная склеродермия
- ❖ Острый микрокристаллический артрит
- ❖ Анкилозирующий спондилоартрит
- ❖ Побочные эффекты базисной терапии

ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ - РФ/EULAR/ACR рекомендации по проведению системной ГК-терапии при ревматических заболеваниях -2017

- Побочные эффекты ГК-терапии должны обсуждаться с больным перед началом ГК-терапии
- Если предполагается использование ГК на длительный период, больной должен вести ГК-дневник (карту), где отмечаются дозы, режим приема, переносимость
- Начальная доза, скорость снижения ее и поддерживающая доза ГК зависят от активности заболевания, переносимости ГК и индивидуальны для каждого больного
- Перед началом ГК-терапии определяются сопутствующие состояния и факторы риска побочных эффектов, обязательно учитывается наличие АГ, диабета, пептической язвы, недавних переломов, наличие хронической инфекции, дислипидемии и прием НПВП

ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ - РФ/ EULAR/ ACR рекомендации по проведению системной ГК-терапии при ревматических заболеваниях -2017

Диагноз **глюкокортикоидного остеопороза** следует ставить при снижении МПК, по данным DEXA (рентгеновской абсорбциометрии (Т-индекс), **на 1 (ACR) - 1,5 (EULAR) стандартных отклонения** от пиковой костной массы, (а не на 2,5 стандартных отклонения, как это принято при постменопаузальном ОП!)

Если пациент начинает прием ГК ≥ 7.5 мг (5 мг - ACR) в сутки более, чем на 3 мес, препараты кальция и витамина D назначаются дополнительно обязательно
Необходима оценка факторов риска

- ❑ Высокая кумулятивная -ежедневная оза ГК
- ❑ Пульс-терапия ГК (внутривенное введение)
- ❑ Низкая масса тела
- ❑ Гипогонадизм, вторичный гиперпаратиреозидизм
- ❑ Семейный анамнез ОП (переломы шейки бедра у родителей)
- ❑ Значимое и /или быстрое снижение МПК превышающее предыдущие данные
- ❑ Курение
- ❑ > 3 допустимых доз алкоголя в день

Основные препараты для лечения ОП

- Селективные модуляторы рецепторов к эстрогену (ралоксифен)
- Препараты паратиреоидного гормона (терипаратид)
- Бисфосфонаты (алендронат, ризендронат, ибандронат, золендронат)
 - Стронция ранелат
 - Деносумаб

БИФОСФОНАТЫ

- Основным фармакологическим эффектом БФ является **более выраженное угнетение костной резорбции**
- Снижают активность остеокластов за счет угнетения образования новых или снижения их выживаемости
- БФ уменьшают или предупреждают отрицательное влияние на кость практически всех известных стимуляторов резорбции, в том числе паратгормона

Режим приема, дозы

- ❑ Принимать 1 таб запивая его большим количеством воды
- ❑ Не запивать АЛЕНДРОНАТ минеральной водой, кофе, чаем или соком
- ❑ Первый прием пищи возможен лишь через 30 минут после приема таблетки
- ❑ После приема АЛЕНДРОНАТА необходимо в течение 30 минут находиться в вертикальном положении

- ❑ Основная причина отказов пациентов от продолжения лечения бисфосфонатами – неудобство в использовании и побочные эффекты
- ❑ Большинство пациентов и врачей предпочитают препараты с меньшей частотой введения

The adherence gap: why osteoporosis patients don't continue their treatment.

International Osteoporosis Federation, 2005

- ❑ **Через 5 лет приема бисфосфонатов в табл. форме и 3 года внутривенных инъекций риск развития переломов должен быть переоценен**
- ❑ **Женщины в постменопаузе с высоким риском вертебральных переломом (или имеющимися переломами позвонков) могут продлить лечение табл. Бисфосфонатами до 10 лет , а внутривенными формами – до 6 лет**

Managing Osteoporosis in patients on long-term Bisphosphonate Treatment[^]
Report of a Task Force of the ASBMR, 2016

❑ Женщины в постменопаузе с низким риском вертебральных переломом (или положительным эффектом терапии – T –критерий выше 2.5 или стабилизация МПК) , могут делать «каникулы» от 2 до 3 лет

При этом обязательно проведение определения МПК в период этих перерывов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило пересмотр рекомендаций по препарату Протелос/Бивалос и инициирует дальнейшее ограничение его использования **пациентами, которые не могут принимать другие одобренные средства для лечения остеопороза.**

Кроме этого, эти пациенты должны быть подвергнуты регулярному врачебному контролю, и лечение **должно быть остановлено при обнаружении заболеваний сердца или проблем с кровообращением**, таких как неконтролируемая гипертензия или ИБС. Как было рекомендовано ранее, пациентам с имеющимися заболеваниями сердца или циркуляторными расстройствами в анамнезе, такими как инсульт или инфаркт, препарат не может быть назначен.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

ДЕНОСУМАБ ИМИТИРУЕТ ДЕЙСТВИЕ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА, СВЯЗЫВАЯСЬ С ЛИГАНДОМ RANK И ПОДАВЛЯЯ ТЕМ САМЫМ АКТИВАЦИЮ ОСТЕОКЛАСТОВ

ГМ-КСФ= гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор

1. R Baron, S Ferrari, G. Russell. Denosumab and bisphosphonates: Different mechanisms of action and effects. Bone 48 (2011) 677–692

ДЕНОСУМАБ (ПРОЛИА) ИМЕЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧНЫЙ ОТ БИСФОСФОНАТОВ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Бисфосфонат

БФ связываются с минеральным веществом кости, поглощаются зрелыми остеокластами в местах костной резорбции

Деносумаб

RANK
Лиганд RANK
Остеопротегерин
Деносумаб

Деносумаб избирательно связывается и блокирует лиганд RANK

подавление формирования, функционирования и выживания остеокластов

ОДНА ПОДКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ДЕНОСУМАБА ЗАЩИЩАЕТ ПАЦИЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ

- ПРОЛИА (деносумаб 60 мг) вводится путем подкожной **инъекции каждые 6 месяцев**
- На фоне терапии деносумабом необходимо дополнительно принимать препараты, содержащие **кальций и витамин D**

Новые препараты для лечения ОП

- **ОДАНАКАТИБ (odanacatib)** - специфический ингибитор катепсина К
- **РОМОЗОЗУМАБ(romosozumab)**
- **БЛОСОЗУМАБ (blosozumab)** моноклональные антитела против склерозина, которые стимулируют формирование кости и снижают костную резорбцию

2018-2020 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА

- ❖ Нет четких и жестких рекомендаций по длительности фармакологического лечения ОП для всех препаратов
- ❖ После трехлетнего периода лечения – факторы риска ОП-переломов (DEXA) должны пересматриваться
- ❖ Нет унифицированных рекомендаций для всех пациентов. Лечение ОП назначается индивидуально!