ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
ФИПО

Особенности лечения сифилиса у детей

доц. Тахташов И. Р.

г.Донецк 10.03.2021 г.

Актуальность темы

Инфицирование плода сифилисом происходит трансплацентарно, начиная с 4 месяца беременности.

При нелеченом сифилисе мать может заражать своих детей на протяжении всего детородного периода, однако наиболее опасным для потомства являются первые 3 года от момента заражения, что соответствует первичному, вторичному и раннему скрытому периоду приобретенного сифилиса.

Принципы лечения сифилиса у детей

Лечение больных сифилисом детей осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами

Специфическое лечение назначается после установления диагноза на основании клинических проявлений, обнаружения возбудителя заболевания и результатов серологического обследования

Начинать лечение необходимо в возможно более ранние сроки (при ранних активных формах сифилиса - в первые 24 часа), поскольку чем раньше начато лечение, тем благоприятнее прогноз и эффективнее его результаты

Препараты выбора для лечения сифилиса у детей

В качестве основного средства лечения сифилиса используются различные препараты пенициллина.

Пенициллин остаётся препаратом выбора в терапии сифилиса.

Противопоказанием к применению препаратов пенициллина для лечения сифилиса может служить их индивидуальная непереносимость.

Возрастные категории при лечении сифилиса у детей

Новорожденные до 7 дней

Возраст 7 - 30 суток

Возраст от 1 месяца

приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192

Лечение врожденного сифилиса у детей до 7 дней

- натриевая соль бензилпенициллина или пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 1 неделя и далее каждые 8 часов 2 недели.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 1 неделя, далее каждые 8 часов 2 недели.
- натриевая соль бензилпенициллина или пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 3-4 недели.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса каждые 12 часов внутривенно 3-4 недели.

Лечение врожденного сифилиса у детей в возрасте 7 - 30 суток

- натриевая соль бензилпенициллина или пенициллин G (натриевая соль) внутримышечно разовая доза 50 000 ЕД/кг веса каждые 8 часов 2 недели.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса каждые 12 часов внутривенно 2 недели.

Лечение врожденного сифилиса у детей в возрасте от 1 месяца

Врожденный сифилис со сроком заражения до 1 года

- натриевая соль бензилпенициллина внутримышечно разовая доза 25 000 ЕД/кг веса каждые 4 часа 3-4 недели.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 8 часов 3 - 4 недели.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 3 - 4 недели.

Лечение врожденного сифилиса у детей в возрасте от 1 месяца

Врожденный сифилис со сроком заражения до 1 года

- прокаин пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 10 000 ЕД/кг вес внутримышечно 1 раз в сутки - 4 недели.
- новокаиновая соль пенициллина внутримышечно 60 000 ЕД 2раза в день 4 недели.

Лечение врожденного сифилиса у детей в возрасте от 1 месяца

Врожденный сифилис со сроком заражения более 1 года

- натриевая соль бензилпенициллина внутримышечно разовая доза 25 000 ЕД/кг веса каждые 4 часа 3-4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц.
- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 8 часов 3 - 4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц.

Лечение врожденного сифилиса у детей в возрасте от 1 месяца

Врожденный сифилис со сроком заражения более 1 года

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 3 - 4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц.
- прокаин пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 10 000 ЕД/кг веса внутримышечно 1 раз в сутки - 4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц.
- новокаиновая соль пенициллина внутримышечно 60 000 ЕД 2 раза в день 4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц.

Спасибо за внимание