


# ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ К КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХОПАТИЧЕСКОГО, АФФЕКТИВНОГО И НЕВРОТИЧЕСКОГО РЕГИСТРОВ



Подготовила: врач-  
интерн  
Чистик Ирина  
Андреевна



**ЦЕЛЬ. ОЦЕНИТЬ ОСОБЕННОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА  
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С  
РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХОПАТИЧЕСКОГО,  
АФФЕКТИВНОГО И НЕВРОТИЧЕСКОГО  
РЕГИСТРОВ.**

## **МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:**

**Обследовано 30 пациентов, находящихся на стационарном лечении в Центре аффективной патологии Республиканской клинической психиатрической больницы г. Донецка.**

**Обследуемые были разделены на три группы.**

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУПП БОЛЬНЫХ

№ группы	1	2	3
Регистр психических расстройств	<b>Психопатоподобный</b>	<b>Аффективный</b>	<b>Невротический</b>
Количество пациентов	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Средний возраст	<b>32,9</b>	<b>34</b>	<b>39,3</b>
SD	<b>12,1</b>	<b>14,3</b>	<b>15,3</b>

Для оценки уровня влияния коронавирусной инфекции был разработан и использован опросник, состоящий из 30 вопросов, утвердительный ответ на каждый из которых оценивался в 1 балл, отрицательный – в 0 баллов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ	
Баллы	Уровень влияния
<i>0-10</i>	<b>незначительное</b>
<i>11-20</i>	<b>умеренное</b>
<i>21-30</i>	<b>значительное</b>

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы Microsoft Excel.

## Распределение больных исследуемых групп в соответствии с баллами опросника оценки уровня влияния коронавирусной инфекции




# Оценка уровня влияния коронавирусной инфекции на больных с расстройствами психопатического, аффективного и невротического регистров

№ группы	1	2	3
Регистр психических расстройств	<b>Психопатоподобный</b>	<b>Аффективный</b>	<b>Невротический</b>
Средний показатель	7,7	8,4	10,0
SD	5,2	5,4	5,7


Статистически достоверными ( $p < 0,001$ ) оказались различия между 3 и 1, а также 3 и 2 исследуемыми группами.

**Это свидетельствует о достоверном преобладании уровня психологического стресса, связанного с коронавирусной инфекцией, у больных с патологией невротического регистра (при недостоверном преобладании данного показателя при аффективной патологии, в сравнении с психопатическим регистром психопатологических проявлений).**


**1 группа**



**2 группа**



**3 группа**




**Соотношение уровней влияния коронавирусной инфекции в исследуемых группах**

## **Выводы.**

1. Установлено достоверное преобладание повышенной озабоченности коронавирусной инфекцией больных с психопатологией невротического регистра, при минимальных значениях стрессогенного воздействия данной инфекции на больных с психопатическим регистром нарушений.
2. У больных с невротическим регистром расстройств также обнаружено преобладание умеренного влияния коронафобических проявлений (при приблизительно одинаковом распределении лиц со значительной подверженностью коронавирусным страхом в 3 исследуемых группах, и максимальном количестве лиц, не ощутивших заметного влияния коронавирусной инфекции, в группе с расстройствами психопатического регистра).

3. Полученные данные могут свидетельствовать о специфической подверженности коронафобическим проявлениям больных с психопатологическими расстройствами невротического регистра в сравнении с пациентами, страдающими нарушениями психопатического и аффективного регистров.



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**