

Особенности поствоспалительной пигментации после разрешения аллергодерматозов

Горбенко А.С.

к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО

г. Донецк 09.06.2021

Поствоспалительные дисхромии (поствоспалительная гиперпигментация, поствоспалительная гипопигментация) - приобретенные расстройства пигментации, возникающие из-за склонности меланоцитов к избыточному или недостаточному синтезу пигмента

Дерматовенерология : национальное руководство / ред. Ю. К.Скрипкин, Ю. С. Бутов, О.Л. Иванов. - Москва : ГЭОТАР-МЕДиа, 2013. - 1024 с. + CD-R. - (Национальные руководства).

Меланоцитарный гипермеланоз (связанный с увеличением количества меланоцитов)

Врожденные

- Периорбитальный гипермеланоз
- Лентигиноз
- Синдром Пейтца-егерса
- Синдром Кронхейта- Канада

Физические

- Центрофациальный нейродистрофический меланоз
- Загар
- Пува
- Солнечное лентиго

Разные

- Эруптивное лентиго
- Сенильное лентиго

Владимиров, В. В. Кожные и венерические болезни. Атлас : учебное пособие / В. В. Владимиров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с.

Меланотический гипермеланоз (связанный с увеличением количества меланина)

Врожденные

- Пятна «кофе с молоком»
- Нейрофиброматоз
- Веснушки
- Семейный периорбитальный меланоз
- Меланоз Беккера

Метаболические

- Поздняя кожная порфирия
- Гемохроматоз

Эндокринные

- Мелазма
- Беременность
- Гормональная терапия
- Болезнь Аддисона

Химические вещества

- бисульфид

Пищевые

- Пеллагра
- Спру

- Недостаточность витамина В12

Физические

- УФО (эритемные дозы)
- Ионизирующая радиация
- Термическая реакция
- Травма

Воспаление и инфекция

- Поствоспалительный меланоз
(лекарственные токсикодермии)
- Красный плоский лишай
- Атопический дерматит
- Псориаз
- Отрубевидный лишай

Неопластические

- Меланома
- Мастоцитоз
- Черный акантоз паранеопластический

Смешанные

- Системная склеродермия
- Хроническая печеночная недостаточность

**Ламоткин, И. А. Клиническая дерматоонкология :
атлас / И. А. Ламоткин. - Москва : БИНОМ, 2011 . -
499 с.**

Классификация дисхромий

Гипермеланозы

1. Первичные гипермеланозы

- Врожденные гипермеланозы: невус пигментный, лентиго юношеское, недержание пигмента
- Наследственные гипермеланозы: веснушки, меланизм, лентигиноз наследственный, лентигиноз периорифициальный

Ламоткин, И. А. Клиническая дерматоонкология : атлас / И. А. Ламоткин. - Москва : БИНОМ, 2011 . - 499 с.

Классификация дисхромий

2. Приобретенные гипермеланозы:

- Ограниченные гипермеланозы: хлоазма, линейная пигментация лба, мелазма, пигментный около ротовый дерматит, каротинодермит Брока
- Диффузные гиперпигментации: болезнь Аддисона, кахектическая меланодермия.
- Токсическая гиперпигментация: меланоз Риля, сетчатая пигментная пойкилодермия лица и шеи, токсическая меланодермия Хофмана–Хабермана, медикаментозные меланодермии
- Артифициальные гипермеланозы: актиническая меланодермия, мраморная пигментация кожи Бушке–Эйхорна, паразитарная меланодермия

Ламоткин, И. А. Клиническая дерматоонкология : атлас / И. А. Ламоткин. - Москва : БИНОМ, 2011 . - 499 с.

Классификация дисхромий

Вторичные гипермеланозы

- Постинфекционная меланодермия: сифилитическая меланодермия, туберкулезная меланодермия
- Поствоспалительные меланодермии: красный плоский лишай; ограниченный нейродермит, узловатая почесуха; склеродермия; крапивница; экзема; пиодермия; буллезные дерматозы

Дерматовенерология : национальное руководство / ред. Ю. К.Скрипкин, Ю. С. Бутов, О.Л. Иванов. - Москва : ГЭОТАР-МЕДиа, 2013. - 1024 с. + CD-R. - (Национальные руководства).

Классификация дисхромий

Гипомеланозы

Первичные гипомеланозы

Врожденные гипомеланозы:

- Отдельные заболевания: беспигментный невус, альбинизм частичный, альбинизм тотальный, альбинизм неполный, пьебалдизм.
- Синдромы с депигментацией. Врожденные синдромы: туберозный склероз или Бурневилля, прингля синдром.
- Наследственные синдромы: Чедиака–Штейнбринка–Хигаси синдром, Синдром Менде, Титце синдром, Зипрковского–Марголиса синдром.
- Идиопатические синдромы: Алезандрини синдром, Фогта–Коянаги–Харада синдром.

Приобретенные гипомеланозы:

- витилиго

Классификация дисхромий

Вторичные гипомеланозы

Постинфекционные гипохромии

- отрубевидный лишай
- простой лишай
- сифилитическая лейкодерма
- лепрозная лейкодермия

Поствоспалительные гипохромии

- псориаз обыкновенный
- склеродермия
- красная волчанка
- парапсориаз
- нейродермит

Владимиров, В. В. Кожные и венерические болезни. Атлас : учебное пособие / В. В. Владимиров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с.

Поствоспалительные дисхромии являются вторичными гипермеланозами следствием таких заболеваний

- атопический дерматит
- красный плоский лишай
- акне
- псориаз
- васкулиты.
- пузырьные дерматозы

Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 680 с.

Поствоспалительные дисхромии после атопического дерматита

- Гипо/ гиперпигментации на местах разрешения высыпаний
- проходят самостоятельно
- лечению не подлежат
- рекомендован уход за кожей дерматокосметическими средствами - длительно

Владимиров, В. В. Кожные и венерические болезни. Атлас : учебное пособие / В. В. Владимиров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с.

Спасибо за внимание