

# Артрозы среди взрослого населения современного Донбасса: частота возникновения и распространение.

Агарков Александр Владимирович,


к.м.н., доцент

Кафедра травматологии, ортопедии и ХЭС

Донецкий национальный медицинский университет им.


М.Горького

X-ray 01



# Актуальность работы

Широкое и активное распространение среди всех возрастных и социальных групп населения Донбасса




# Цель исследования


изучение частоты  
возникновения и  
распространения артрозов  
среди взрослого населения  
современного Донбасса




X-ray 01



# Частота возникновения артрозов




# Распространение артрозов




# Ранговая структура

Нозологические формы	Частота возникновения первичных случаев болезней		Частота распространения болезней	
	Ранг	%	Ранг	%
1.Дорсопатии и спондилопатии	1	47,42	3	21,88
2.Артриты	2	26,63	1	38,30
3.Деформирующие артрозы	3	16,53	2	29,83
4.Поражение межпозвоночных дисков	4	4,90	4	3,62
5.Ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания	5	3,22	5	3,43
6.Артропатии солевые	6	0,47	7	0,9
7.Артропатии подагрические	7	0,47	8	0,8
8.Ревматоидный артрит самостоятельная форма	8	0,36	6	1,31
9.Спондилиты анкилозирующие	9	0,041	9	0,02
10.Системная красная волчанка	10	0,023	10	0,01

## Первичные проявления артроза




# Показатели распространённости артроза



■ 2002 ■ 2004 ■ 2006 ■ 2008 ■ 2010 ■ 2012 ■ 2014

# Выводы:

1. Частота возникновения первичных случаев артрозов 54,83% случаев на 10000 человек.
2. Показатели распространения артрозов находятся в пределах 454,66 случаев на 10000 человек.
3. Первые три позиции занимают дорсопатии и спондилопатии (1-е место, 47,42% случаев), артрозы (2-е место, 26,63% случаев) и деформирующие артрозы (3-е место, 16,53% случаев). В структуре болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани по показателю распространенности на 1-е ранговое место выходят артрозы (38,30% случаев).
4. Двенадцатилетняя современная динамика артроза по показателю первичных случаев заболеваний имеет выраженную волновую природу, а показатель частоты возникновения снизился за 12 летний период среди взрослого населения на 11,65% случаев, тогда как показатель распространенности артроза за этот период повысился на 55,3% случаев.
5. Болезненность современного взрослого (18 и более лет) населения артрозами значительно (>55%) возросла и прогрессивно увеличивается.



**Спасибо  
за  
внимание!!!**

