

*Особенности непсихотических  
психических расстройств у лиц с ожоговой  
травмой*

Вильдгрубе С.А. Кандидат психологических наук, доцент.

Фирсова Г.М. Ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии,  
психосоматики и психотерапии с лабораторией психического здоровья ГОО ВПО  
ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.

*Донецк 2021*

*Объект исследования* — непсихотические психические расстройства личности.

*Предмет исследования* — особенности непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой.

*Цель исследования*— изучить особенности непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой.

## *Гипотезы исследования:*

1. Существуют гендерные различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой.
2. Существуют различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств от источника травмы.
3. Существуют различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой и лиц с другими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)).

## *Методы исследования*

Теоретические: анализ, синтез, систематизация, сравнение, обобщение научной литературы и эмпирических материалов.

Эмпирические: наблюдение, беседа.

Психодиагностические:

- методика «Шкала депрессии Бека»;
- методика «Оценка личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилберга - Ю. Л. Ханина»;
- опросник «Выраженность психопатологической симптоматики SCL-90-R».
- методика «Тест Люшера».

Методы математической статистики: описательная статистика,  $t$  - критерий Стьюдента, корреляционный анализ (коэффициент линейной корреляции Пирсона).


## *Выборка исследования*

Исследование проводилось в «Институте неотложной и восстановительной хирургии» им. В.К. Гусака в период с 2018 по 2021 год.


Общее количество человек в выборке исследуемых – 67. Из них 46 человек с ожоговой травмой, которые находились на лечении в ожоговом отделении ИНВХ, 21 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые проходили лечение в отделении кардиохирургии и тромболизиса.

Возраст исследуемых от 30 до 59 лет.


## Итоги 1 гипотезы



Среднегрупповые значения оценки личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилберга - Ю. Л. Ханина




Среднегрупповые значения по методике «Шкала депрессии Бека»




Среднегрупповые значения по опроснику «Выраженность психопатологической симптоматики SCL-90-R»







Среднегрупповые значения по методике «Тест Люшера»

## Итоги 2 гипотезы






Среднегрупповые значения по методике «Шкала депрессии Бека»



Среднегрупповые значения по опроснику «Выраженность психопатологической симптоматики SCL-90-R»




Химическое воздействие

Электрическое воздействие


■ Синий 
 ■ Зеленый 
 ■ Красный 
 ■ Желтый 
 ■ Фиолетовый 
 ■ Коричневый 
 ■ Черный 
 ■ Серый

Среднегрупповые значения по методике «Тест Люшера»


## Итоги 3 гипотезы



Среднегрупповые значения оценки личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилберга - Ю. Л. Ханина




Среднегрупповые значения по методике «Шкала депрессии Бека»



Среднегрупповые значения по опроснику «Выраженность психопатологической симптоматики SCL-90-R»





Ожоговая травма

ССЗ

■ Синий ■ Зеленый ■ Красный ■ Желтый ■ Фиолетовый ■ Коричневый ■ Черный ■ Серый

Среднегрупповые значения по методике «Тест Люшера»

## *ВЫВОДЫ*

1. Первая гипотеза была опровергнута. Не существуют гендерные различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой.
2. Вторая гипотеза была опровергнута. Не существуют различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств от источника травмы.
3. Третья гипотеза подтвердилась. Существуют различия в особенностях протекания непсихотических психических расстройств у лиц с ожоговой травмой и у лиц с другими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)).

*Спасибо за внимание!*