

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С РАБИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2021 ГОДУ

Беседина Е.И., Мельник В.А., Лыгина Ю.А., Демкович О.О., Скрипка Л.В., Бояр О.А.

ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ. М. ГОРЬКОГО»

Рабическая инфекция широко распространена среди животных во всем мире и может формировать природные очаги. Кроме того, несмотря на успехи проводимой вакцинопрофилактики, случаи данного заболевания регистрируются и в человеческой популяции. Наиболее распространенным источником заражения людей рабической инфекцией в мире являются домашние и бродячие собаки (до 99% случаев), кошки и летучие мыши. В настоящее время в Российской Федерации (РФ) приобретают высокую эпидемическую значимость дикие лисицы. В Донецкой Народной Республике (ДНР), сопредельной с РФ, наиболее часто источником инфекции выступают собаки, а также увеличивается доля кошек в реализации эпидемического процесса бешенства. Нами проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных официальной регистрации пострадавших от укусов животных, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения гг. Донецка и Макеевки, а также случаев лабораторно подтвержденного бешенства у животных за 2020 г. В ходе исследования установлено, что в г. Донецке обращаемость в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) по поводу укусов животных в 2020 г. снизилась на 25,6%, показатель обращаемости при этом составил 129,5 на 100 тыс. населения (1223 человека). Из обратившихся за антирабической помощью приступили к лечению 42,5% пострадавших. Самовольно прекратили лечение 3,1% укушенных (в 2019 г. — 5,1%). Вместе с тем, в г. Макеевке за антирабической помощью обратилось 669 человек (показатель обращаемости — 188,1 на 100 тыс. населения). При этом отмечено снижение обращаемости на 1,2% — в 2019 г. данный показатель составил 217,0 на 100 тыс. населения (813 чел.). Из числа обратившихся антирабическому лечению подлежали 21,9%, получили полный курс прививок — 15,9%, отказались от лечения — 0,9%, самовольно прекратили лечение — 1,1 %, прекратили лечение, т. к. животное было найдено и находилось под наблюдением — 0,9% обратившихся. Комбинированный курс лечения препаратами для антирабического лечения (КоКАВ, антирабический иммуноглобулин). В 2020 г. эпизоотическая ситуация по бешенству в ДНР оставалась напряженной, однако наблюдалось снижение заболеваемости в 1,4 раза среди животных. Наибольшее количество случаев лабораторно подтвержденной рабической инфекции у животных регистрировалось у домашних и бродячих котов, а также собак. Ветеринарной службой организовано и проведено ветеринарное наблюдение за 39 животными из 576 направленных в ветслужбу оборотных карт (6,8%), в 2019 — за 46 животными (7,0 %).

В 2020 году в ДНР проводилась профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства, было привито 29776 животных, из них 94,3% собак, 5,7% котов (в 2019 году — 22411 домашних животных, из них: собак — 82,6%, котов — 17,4%). В городских охотничьих угодьях города проведена иммунизация против бешенства плотоядных животных на площади 50 кв. км, использовано 1000 доз пероральной вакцины (в 2019 г. — на площади 30 кв. км, использовано 500 доз пероральной вакцины.)

Таким образом, в настоящее время на территории гг. Донецка и Макеевки отмечается некоторое снижение заболеваемости животных рабической инфекцией. Улучшен контроль за проведением иммунизации против бешенства среди домашних и диких плотоядных животных, профилактические и противозидемические мероприятия проводятся на достаточном уровне. Для совершенствования эпидемиологического надзора за рабической инфекцией необходимо тщательное проведение санитарно-просветительской работы среди населения и совместная слаженная работа санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб.

