ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Кафедра инфекционных болезней

Лечение больных пневмонией, ассоциированной с COVID-19, в инфекционном стационаре

В.В. Куропятник

Актуальность. Данные ВОЗ

Панель управления ВОЗ по коронавирусу (COVID-19)

Имя	Случаи - кумулятивная сумма $\updownarrow$	Случаи - новые зарегистрированные за последние 24 часа	Смертей - общее количество	Смерти - новые зарегистрированные за последние 24 часа
Глобальный	238 521 855	364 373	4 863 818	5 707
Americas	91 589 750	73 091	2 247 451	1 180
Европа	72 401 975	208 958	1 368 021	3 039
Юго-Восточная Азия	43 457 596	27 455	682 813	360
Восточное Средиземноморье	16 031 234	21 315	294 840	381
Западная часть Тихого океана	8 946 762	27 592	122 132	535
Африке	6 093 774	5 962	148 548	212
Соединенные Штаты Аме...	44 194 808	52 209	710 757	540
Индия	34 001 743	15 823	451 189	226
Бразилия	21 582 738	6 918	601 213	202
Объединенное королевство	8 231 441	37 668	137 944	181
Российская Федерация	7 861 681	28 717	219 329	984
Турция	7 508 975	33 860	66 605	237

Актуальность. Данные РФ

В Российской Федерации с 3 января 2020 г. до 13 октября 2021 г. в ВОЗ было зарегистрировано **7 861 681** подтвержденный случай COVID-19, из которых **219 329** умерли . По состоянию на **5 октября 2021** года введено **91 151 285** доз вакцины .

Актуальность. Данные ДНР

Всего на 13 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики - 73 319

на лечении - 11 266 пациентов

выписаны - 56 475 человек

летальных случаев - 58 578

Всего на лечении 3908 пациентов с пневмониями, из них 1417 на кислородной поддержке

Клинические варианты и проявления COVID-19

Классификация COVID-19 по степени тяжести

Легкое течение

Т тела < 38 °С,
кашель, слабость,
боли в горле

Отсутствие
критериев
среднетяжелого и
тяжелого течения

Среднетяжелое течение

Т тела > 38 °С

ЧДД > 22/мин

Одышка при физических
нагрузках

КТ/ RO- min/ средний
объем поражения

SpO2 < 95%

СРБ сыворотки крови
>10 мг/л

Тяжелое течение

ЧДД > 30

SpO2 ≤ 93%

PaO2 / FiO2 ≤ 300 мм
рт.ст.

Снижение уровня
сознания, агитация

Нестабильная
гемодинамика

КТ/ RO- значительный/
субтотальный объем
поражения

Лактат артериальной
крови > 2 ммоль/л

qSOFA > 2 балла

Крайне тяжелое течение

Стойкий фебрилитет

ОРДС

ОДН, требует
респираторной
поддержки

ПОН

КТ/ RO -
значительный/
тотальный объем
поражения

Предикторы тяжелого течения

Злокачественное новообразование

Ожирение

Сахарный диабет

**Заболевания ССС,
почек, легких**

Гипоальбуминемия

Возраст старше 60 лет

Этиотропная терапия

Этиотропная терапия

Фавипиравир

Ремдесевир

Умифеновир

Интерферон-альфа

Этиотропная терапия

- ▶ **Фавипиравир (коронавир)** - ингибитор РНК-полимеразы
- ▶ По данным литературы использование связано с быстрыми темпами вирусного клиренса и положительной R0-динамикой (на 14 сутки) по сравнению с лечением лопинавир-ритонавир
- ▶ РКИ препарата продолжаются
- ▶ Собственные наблюдения
 - ▶ 8 пациентов, получивших препарат по полной рекомендуемой схеме. У всех больных отмечена элиминация вируса после завершения приема препарата, однако на сроки разрешения пневмонии препарат не влиял.
 - ▶ У 1 больного наблюдался выраженный вестибуло-атактический синдром, который был проявлением поражения головного мозга вирусом и не разрешился к моменту выписки из стационара

Этиотропная терапия

- ▶ **Ремдесивир** - нуклеотидный аналог АТФ, конкурирует с природным АТФ-субстратом за включение в формирующиеся РНК-цепи с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы SARS-CoV-2
- ▶ Лиофилизат 1-й день: 200 мг однократно в/в., со 2-го дня: 100 мг в/в 1 р/сут. Общий курс не более 10 дней.

Этиотропная терапия

- ▶ **Умифеновир (Арбидол)** - ингибитор слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран
- ▶ Лечение легкой формы COVID-19 в амбулаторных условиях
- ▶ Медикаментозная профилактика COVID-19 как здоровым лицам, так и лицам из групп риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями)
- ▶ Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19, включая медицинских работников
- ▶ Противопоказан при беременности

Клиническая характеристика пациентов COVID-19, получавших противовирусные препараты

Показатель	Группы обследованных		
	<u>Лопинавир-ритонавир</u> (калидавир) n=117	<u>Гидроксихлорохин</u> (иммард) n=25	Контрольная группа n=21
Тяжесть заболевания:			
легкое	18	3	5
средней тяжести	72	14	10
тяжелое	27	8	6
Длительность лихорадки(дни)	13,7	25,3	10,6
Респираторная поддержка	45,3%	33,3%	40,4%
Перевод в ОИТ	19,7 %	16,0%	19,0 %
Исходы пневмонии (СКТ/Рo):			
Норма	42,2%	13,3%	33,3%
Динамика отсутствует	7,8 %	6,7%	22,2%
Динамика положительная	36,7%	6,7%	22,2%
Стадия разрешения	11,1 %	26,7 %	22,2%
Доза дексаметазона (мг)	8	15,2	10,3
Длительность приема дексаметазона (дни)	11,5	10	7

Этиотропная терапия

- ▶ Показатели в группе контроля, не получавших противовирусные препараты, достоверно не отличались от таковых в двух исследованных группах.
- ▶ При сравнении эффективности противовирусных препаратов можно отметить у больных, получавших калидавир, меньшую продолжительность лихорадки, более высокую частоту нормальных показателей СКТ легких при контрольном обследовании
- ▶ Частота побочных симптомов была больше при лечении калидавиром.
- ▶ При лечении иммардом токсические кардиологические признаки не наблюдались.

Патогенетическая и антибактериальная терапия

O₂-терапия

- ▶ Пациенты с тяжелым течением заболевания получали поддержку кислородом
- ▶ Старт с 5 л/мин до 15 л/мин
- ▶ Коррекция скорости потока до достижения оптимального уровня SpO₂ ≥ 90%.

Глюкокортикостероиды (ГК)

- ▶ ГК являются препаратами первого выбора для лечения больных с тяжелым и очень тяжелым течением (пневмония с дыхательной недостаточностью/ОРДС, признаки «цитокинового шторма»)
 - ▶ Метилпреднизолон в дозе 125 мг/введение в/в каждые 12 ч
 - ▶ Дексаметазон в дозе 16-24 мг/сутки в/в за 1-2 введения
 - ▶ Максимальная доза ГК применяется в течение 3-4 суток
 - ▶ Доза ГК снижается при стабилизации состояния (купирование лихорадки, стабильное снижение уровня СРБ, ферритина, АЛТ, АСТ, ЛДГ сыворотки крови)
 - ▶ Доза постепенно снижается на 20-25% на введение каждые 1-2 суток в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток, до полной отмены

ГК

Собственные наблюдения

- ▶ 56 пациентов с COVID-19, подтвержденной ПЦР мазков из носоротоглотки
- ▶ Гендер: женщин - 29, мужчин-27
- ▶ Возраст: 35-81 год, средний возраст $59,4 \pm 1,4$)
- ▶ Пациенты госпитализированы в поздние сроки болезни ($8,8 \pm 1,02$)

- ▶ Критерии назначения ГК:
 - ▶ степень ДН(SpO_2 ниже 92 %, ЧДД, ЧСС, АД)
 - ▶ КТ:
 - ▶ 48,2 % - более 50 % поражения легких (КТ-3)
 - ▶ 51,8 % - 25-50 % поражение легочной ткани (КТ-2)

- ▶ Дексаметазон в/в в средней дозе 12 мг/сутки, однако у 16,1 % начальная доза составила 20-16 мг/сутки
- ▶ Длительность курса ГК была ($9,6 \pm 0,7$) дней

ГК

Собственные наблюдения

- ▶ На фоне проводимой терапии в 1 сутки у **78,6 %** пациентов нормализовалась температура тела, улучшались показатели газообмена
- ▶ В среднем стойкая нормализация наблюдалась через $3,4 \pm 0,5$ суток,
- ▶ Всем пациентам осуществлялась респираторная поддержка, антибиотикотерапия, вводились антикоагулянты

- ▶ Однако у **37,5 %** больных при улучшении клинического состояния (нормализация температуры тела, повышение уровня SpO_2 и толерантности к физической нагрузке) при контрольном СКТ исследовании не отмечена положительная динамика в легких
- ▶ Дексаметазон пролонгированно с постепенным снижением дозы, при этом курс лечения достигал 14-20 дней

- ▶ Побочные симптомы:
 - ▶ лейкоцитоз (в единичных случаях- гиперлейкоцитоз)
 - ▶ гипергликемия у больных СД, что не являлось поводом для отмены дексаметазона и требовало коррекции доз ССП или перехода на инсулин

Антикоагулянты

- ▶ Всем пациентам в обязательном порядке назначалась терапия низкомолекулярными гепаринами под контролем коагулограммы
- ▶ Низкомолекулярные гепарины
 - ▶ Эноксапарин натрия (анфибра, гемапаксан, квадрапарин, клексан)
 - ▶ Надропарин (фраксипарин, элмапарин)
 - ▶ Далтепарин (дальтеп, фрагмин)
 - ▶ Парнапарин (флюксум)
 - ▶ Бемипарин (цибор)
- ▶ Нефракционированный гепарин
- ▶ Пероральные антикоагулянты
 - ▶ Ривароксабан (ксарелто)
 - ▶ Апиксабан
 - ▶ Дабигатран этексилат (прадакса)

Ингибиторы интерлейкинов

- ▶ Антагонисты рецептора ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, левилимаб).
- ▶ Блокатором ИЛ-6 (олокизумабом) возможно применение комбинированной терапии, путем назначения антагониста рецептора ИЛ-6 и при неэффективности терапии через 12-24 часа, дополнительное применение блокатора ИЛ-6 (олокизумаба) в рекомендуемых дозах.
 - ▶ Барицитиниб (олумиант) - ингибитор янус-киназы, рекомендовано 4 мг 1 р/сут per os в течение 7-14 дней.
 - ▶ Нетакимаб (эфлейра) - рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, ингибирующие ИЛ-17А. Назначается 60 мг/мл 2,0 мл п/к.
 - ▶ Олокизумаб (артлегия) - гуманизированные моноклональные антитела изотипа иммуноглобулина G4/каппа, разработанные в качестве антагониста ИЛ-6. Назначается 128 мг 0,8 мл п/к или в/в капельно.

Ингибиторы интерлейкинов

- ▶ **Моноклональные антитела, ингибирующие рецепторы ИЛ-6:**
 - ▶ **Левалимаб (илсира) - эскалационная доза - 648 мг в/в в сочетании с ГКС однократно (четыре преднаполненных шприца по 162 мг/0,9 мл)**
 - ▶ **Тоцилизумаб (актемра) - 4-8 мг/кг в/в (не больше 800 мг) в сочетании с ГКС.**
 - ▶ **Сарилумаб (кевзара) - назначается в дозе 200 мг или 400 мг п/к или внутривенно.**

- ▶ **Моноклональные антитела, ингибирующие рецепторы ИЛ-1β:**
 - ▶ **Канакинумаб - назначается в дозе 4 мг/кг (не больше 300 мг) внутривенно при невозможности использования или неэффективности тоцилизумаба или сарилумаба.**
 - ▶ **Анакинра - назначается в дозе 200-400 мг/сут, в течение 10 дней внутривенно капельно.**

Ингибиторы интерлейкинов

- ▶ Антагонисты рецептора ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, левилимаб), блокаторы ИЛ-6 (олокизумаб) и ИЛ-1 (канакинумаб, анакинра) назначаются в сочетании с ГКС.
- ▶ Повторное введение ингибиторов интерлейкина возможно при сохранении фебрильной лихорадки более 12 ч после первой инфузии.
- ▶ **Показанием** для назначения ингибиторов интерлейкина при течении заболевания типичном для SARS-CoV-2, наличие поражение легочной паренхимы, соответствующих КТ1-4 в сочетании с 2 или более нижеуказанными признаками:
 - ▶ SpO₂ ≤ 93%, одышка в покое/прогрессирующая одышка в течение первых 2-3 дней
 - ▶ СРБ ≥ 8N или рост уровня СРБ в 3 раза на 3-5 дни заболевания
 - ▶ Лихорадка > 38 °С в течение 2-3 дней;
 - ▶ Число лейкоцитов < 3,0*10⁹/л
 - ▶ Абсолютное число лимфоцитов < 1*10⁹/л
 - ▶ ферритин крови ≥ 2 норм на 3-5 дни заболевания
 - ▶ ЛДГ крови ≥ 1,5 норм на 3-5 дни заболевания
 - ▶ ИЛ-6 > 40 пк/мл

41

пациент, получавший
антицитокиновую терапию

23

18

28-71 лет
M±57,7

ПЦР РНК
SARS-CoV-2 и
IgM

Пневмония
КТ-2-3

11

Тоцилизумаб (АКТЕМРА)

14

Адалимумаб (ХУМИРА)

4

Олокизумаб (АРТЛЕГИЯ)

2

Базиликсимаб (СИМУЛЕКТ)

2

Барицитиниб

2

Нетакимаб (ЭФЛЕЙРА)

1

Барицитиниб+хумира

6

Левилимаб (ИЛСИРА)

2

Тоцилизумаб+хумира

Антибактериальная терапия. Средне-тяжелое течение

- ▶ Респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин)
- ▶ Цефалоспорины 3-го и 4-го поколения
- ▶ Макролиды
- ▶ Амоксициллин/клавулановая кислота
- ▶ Реже - карбапенемы, ванкомицин

Антибактериальная терапия. Тяжелое течение

карбапенемы, ванкомицин, цефалоспорины 3-4-го поколения (цефотаксим, цефепим) в/в

+

респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин), реже - макролиды

Антибактериальная терапия

- ▶ Пациентам с наличием факторов риска инфицирования *Staphylococcus aureus* целесообразно эмпирическое назначение препаратов, обладающих антистафилококковой активностью (линезолид, ванкомицин) в комбинации с респираторными фторхинолонами, вводимыми в/в.

Антибактериальная терапия

БАЗИС

- В-лактам с антисинегнойной активностью (пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем/циластатин, дорипенем)
- +
- цiproфлоксацин ИЛИ левофлоксацин

АЛЬТЕРНАТИВА

- В-лактам с антисинегнойной активностью
- +
- аминогликозиды II-III и макролиды, ИЛИ респираторные фторхинолоны

Актуальные задачи

- ▶ Продолжить информирование врачей первичного звена, СМП, узких специалистов, привлеченных к работе в ковидных стационарах о клинико-рентгенологических особенностях вирусных пневмоний в ранние сроки заболевания с целью своевременной госпитализации и лечения, профилактики тяжелых осложнений Covid-19
- ▶ Своевременная оценка тяжести пациента, признаков ТОРС на догоспитальном этапе
- ▶ Недопустимо назначение ГК амбулаторно без связи с тяжестью заболевания, оптимальной дозой и сроками лечения, без контроля за лабораторными показателями
- ▶ Недопустимо нерациональное назначение АБТ и полипрогмазия на догоспитальном этапе
- ▶ Внедрение в клиническую практику отделений лечения тяжелых и очень тяжелых форм COVID-19, осложненной пневмонией, ТОРС ингибиторов интерлейкинов

Заключение

Пандемия инфекции, вызванной коронавирусом SARSCoV-2 (COVID-19), была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 г., и к настоящему моменту очевидно, что пандемический потенциал вирусом не исчерпан. Появление новых штаммов, таких как Delta, распространившегося по всему миру, вносит коррективы в клинику заболевания, обуславливает моделировать тактику лечения больных. Опыт ведения пациентов с COVID-19 с начала пандемии продемонстрировал большое количество побочных эффектов от применяемых препаратов противовирусного и противовоспалительного действия, в связи с чем по-прежнему существует необходимость поиска эффективных и безопасных средств лечения COVID-19.

**Спасибо
за внимание!**