

Встречаемость вирусных дерматозов у больных с атопическим дерматитом

Боряк С.А.

доцент кафедры дерматовенерологии и
косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Донецк 13 апреля 2022г.

Атопический дерматит (АтД) –

... иммуновоспалительное заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии высыпаний, характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью как к аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям

Основные звенья патогенеза АД

* генетически детерминированные нарушения:

- врожденного и приобретенного иммунитета;
- нарушения функции эпидермального барьера, ведущую роль при этом играют мутации генов филаггрина, а также вариабельность генов протеаз и их ингибиторов, которые, в последующем, способствуют сохранению универсальной сухости кожи (ксерозу)

Вирусные инфекции у пациентов с АтД...

- * ... являются результатом:
 - повреждения внутренних иммунных механизмов;
 - нарушения кожного клеточно-опосредованного иммунитета;
 - лечения топическими кортикостероидами и ингибиторами кальциневрина (в некоторых случаях)


- Атопический дерматит и экзематозные расстройства / под ред. : Дональда Рудикоффа, Стивена Р.Коэна, Ноа Шайнфельда ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Потекаева, А. Н. Львова. – Москва , 2017. – 384 с.

Материалы и методы

- * Под наблюдением находилось 230 больных АД
- * Сопутствующая дерматологическая патология (145 случаев) выявлена у 98 (42,6%) больных, среди которой наиболее часто были вирусные – у 29 (20%) и микотические – у 16 (11%) дерматозы

Сопутствующая дерматологическая патология у 98 больных АД

число случаев, %



Выявленные вирусные дерматозы у больных АтД в зависимости от возраста и пола

Сопутствующая патология	Возраст, пол, количество случаев						Всего случаев абс / %
	До 2 лет		2 года-13 лет		Старше 13л.		
	м абс	ж абс	м абс	ж абс	м абс	ж абс	
Контагиозный моллюск	2	1	4	4			11/37,9
Бородавки плоские, вульгарные			3	4	1	4	12/41,4
Герпес			2		1	2	5/17,2
Остроконечные кондиломы						1	1/3,5
Всего	2	1	9	8	2	7	29/100

Выявленные вирусные дерматозы у больных АтД в зависимости от возраста и пола (продолжение)

- * Вирусные дерматозы, выявленные у 29 (20,0%) больных, встречались во всех возрастных группах, но несколько чаще в возрасте от 2 до 13 лет – у 17 (34,7%), чаще у мужчин, чем у женщин – 9 (40,9%) и 8 (29,6%) соответственно.
- * **В возрастной группе до 2-х лет было зарегистрировано 3 случая (100%) контагиозного моллюска**

Выявленные вирусные дерматозы у больных АтД в зависимости от возраста и пола (продолжение)

* В возрастной группе от 2 до 13 лет

- диагноз контагиозного моллюска был установлен у 8 (47%) больных АтД – у 4 девочек и 4 мальчиков;
- бородавки плоские, вульгарные были у 7 (41,2%) пациентов. Несколько чаще они встречались у женщин (4 случая), чем у мужчин (3 случая);
- У 2-х (11,8%) мальчиков были проявления простого герпеса

Выявленные вирусные дерматозы у больных АтД в зависимости от возраста и пола (продолжение)

- * У лиц старше 13 лет также чаще встречались поражения кожи, вызванные вирусом папилломы человека – у 6 (66,6%)
- * У 3-х (33,3%) больных АтД был зарегистрирован простой герпес (в т.ч. генитальный)
- * Вирусные поражения кожи чаще наблюдали у женщин данной возрастной группы, чем у мужчин – 7 (77,8%) и 2 (22,2%) соответственно

Выводы

- * Вирусные дерматозы лидируют в сопутствующей дерматологической патологии у больных АтД
- * Наиболее часто они встречаются у больных АтД в возрасте до 13 лет
- * Для разных возрастных периодов характерно развитие определенных вирусных дерматозов

Возможности предупреждения вирусных высыпаний при АД

- * Своевременное лечение активных проявлений АД
- * Восстановление нарушенного кожного барьера (эмолиенты)
- * Повышение устойчивости кожи к внешним и внутренним раздражителям (UVB 311 nm фототерапия, витамин Д)



Спасибо за внимание!

