


**ХАРАКТЕРИСТИКА КАШЛЯ ПРИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ**

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПУЛЬМОНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА» ДОНЕЦК, 26.04.2022**

Прохоров Е.В., Пшеничная Е.В.



Аллергический ларингит

- Чаще возникает у детей в возрасте от 1 до 3 лет с сенсibilизацией к пищевым аллергенам, возможна аллергическая реакция и на другие группы аллергенов.

Аллергический ларингит

```
graph TD; A[Аллергический ларингит] --> B[острый]; A --> C[хронический]
```

острый

хронический

Аллергический ларингит

- При остром течении заболевание начинается обычно ночью с грубого лающего кашля, осиплости голоса, ощущения постороннего тела в горле, боли при глотании.

Аллергический ларингит

- В более тяжелых случаях развивается стеноз гортани с шумным, затрудненным вдохом, приступами кашля, втяжением межреберий, яремной и подключичной ямок на вдохе, периоральным цианозом.

Аллергический ларингит

- При нарастании стенотических явлений одышка усиливается, возникает периферический цианоз, холодный пот, ребенок мечется в кровати, занимает вынужденное положение. Могут развиваться все четыре стадии стеноза. Заболевание обычно имеет рецидивирующий характер.

Аллергический ларингит

- При хроническом течении аллергического ларингита наблюдается ослабление звучности, изменение тембра голоса, дисфония, покашливание.

Аллергический трахеит

- Этиологический фактор:
сенсibilизация к аллергенам
домашней пыли, эпидермальным
аллергенам.

Аллергический трахеит

- характеризуется приступами сухого, громкого, грубого кашля, хрипотой, которые появляются чаще ночью и сопровождаются болезненными ощущениями в грудной области. Если в процесс аллергического воспаления не вовлечены бронхи, то хрипы над легкими не выслушиваются.

Аллергический трахеит

- Протекает волнообразно, может длиться несколько месяцев. Несмотря на мучительный характер приступов кашля, общее состояние детей остается мало нарушенным.

Аллергический трахеит

- Довольно часто аллергический трахеит сопровождается симптоматикой, характерной для аллергических поражений верхних дыхательных путей.

Аллергический бронхит

- Поведение детей капризное, раздражительное, вялость и повышенная потливость.
- Нормальная или слегка повышенная температура сопровождается частыми приступами кашля. Обычно навязчивые приступы кашля у детей случаются в ночное время, из-за чего появляется бессонница.

Аллергический бронхит

- Один из характерных предвестников бронхита — ощущение зуда в носоглотке.
- Может сопровождаться приступами удушья.

- Кашель - один из самых ярких симптомов аллергического повреждения респираторной системы.

Характеристика аллергического кашля

- приступообразный лающий кашель у ребенка, начинающийся внезапно
- затяжные приступы аллергического кашля
- длительность сухого кашля до 2 - 3 недель, без температуры, но с возможными явлениями ринита

Характеристика аллергического кашля

- ⦿ аллергический кашель это выраженный ночной кашель, со снижением интенсивности в дневное время
- ⦿ при появлении мокроты она прозрачная, не имеет признаков гнойного поражения
- ⦿ сопутствуют симптомы в виде стойкого раздражения в носу и горле, а также чиханья.

Характеристика аллергического кашля

- ⦿ характерны сезонные обострения или рецидивы, вызванные контактом с различными агентами/животными
- ⦿ связь с особенностями быта ребенка (домашние животные, в т. ч. птицы, как источника орнитоза, наличие в детской комнате ковров, ворсистых покрытий, мягких игрушек и пр.)

Признаки аллергического кашля

- Отсутствие эпидемиологического анамнеза (контакта с инфекционным больным), наличие у ребенка катаральных явлений в носо- и ротоглотке инфекционного генеза.
- В отличие от аллергической природы, кашель при физической нагрузке возникает во время бега, занятий спортом.