

III Республиканская научно-практическая конференция
«Республиканский и международный опыт охраны
репродуктивного здоровья детей, подростков и
молодежи»

Психологические особенности больных алкоголизмом и их динамика в процессе психотерапевтической коррекции

*Вильдгрубе С.А. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
ГОУ ВПО ДонНУ.*

Крамаренко Е.В. Младший . научный сотрудник ИНВХ.

*Фирсова Г.М. Ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии,
психосоматики и психотерапии с лабораторией психического здоровья ГОУ
ВПО ДОННМУ им. М.Горького. Научный сотрудник ИНВХ.*

Целью данного исследования выступает изучение психологических особенностей больных алкоголизмом, обратившихся за врачебной помощью до и после прохождения цикла психотерапевтической коррекции.

Объектом является личность больного алкоголизмом.

Предметом – динамика психологических особенностей больных алкоголизмом в процессе психотерапии.

Гипотезы

1. Психологические особенности больных алкоголизмом с разным стажем зависимости будут различаться.
2. В процессе психотерапевтической коррекции будут наблюдаться изменения терапевтических установок больных, мотивов воздержания от потребления алкоголя, особенностей самоотношения и доминирующего психического состояния.

Эмпирические методы :

- беседа;
- анкетирование (сбор анамнеза, социально-психологических характеристик больных);
- «Опросник мотивов потребления алкоголя и воздержания от потребления алкоголя» (МПВА) В.Ю. Завьялова;
- «Тест для оценки терапевтических установок» Ю.В. Валентика;
- опросник самоотношения С.Р. Пантелеева;
- методика диагностики доминирующего состояния Л.В. Куликова;
- опросник стратегий адаптивного поведения (АСП);
- интегративный тест тревожности Л.И. Вассермана.

Эмпирическая база исследования:

- Исследование проводилось на базе Городского наркологического диспансера г. Горловки в 2018-2020 годах.
- Выборку исследования составили 42 человека больных алкоголизмом и обратившихся за врачебной помощью, из них 12 женщин и 30 мужчин в возрасте 32-55 лет.
- Большинство больных злоупотребляли алкоголем более одного года. 76% испытуемых имели стаж алкогольной зависимости от 3-х до 10-ти лет. 5% испытуемых имели стаж зависимости более 10-ти лет.

Эмпирическая база исследования:

- 42 человека больных алкоголизмом и обратившихся за врачебной помощью, из них 12 женщин и 30 мужчин в возрасте 32-55 лет.
- 76% испытуемых имели стаж алкогольной зависимости от 3-х до 10-ти лет.
- 5% испытуемых имели стаж зависимости более 10-ти лет.
- На момент предварительной психодиагностики больные имели срок воздержания от алкоголя от 7 до 21 дня.
- Повторная диагностика проводилась после курса психотерапевтического и медицинского лечения. К этому моменту срок воздержания от алкоголя у испытуемых составлял от 6-ти до 12-ти месяцев (срок терапевтической ремиссии).




Рис.1. Результаты сравнения средних показателей больных алкоголизмом и здоровых людей по доминирующим психическим состояниям




Рис.2. Результаты сравнения средних показателей больных алкоголизмом с различным стажем зависимости и здоровых людей по доминирующим психическим состояниям

Таблица 1.

Результаты сравнения средних показателей доминирующих психических состояний у
больных со стажем алкогольной зависимости
менее 5 и более 7 лет

Показатель выраженности психического состояния	Категория испытуемых			
	Средние показатели больных алкоголизмом со стажем до 5 лет	Средние показатели больных алкоголизмом со стажем более 7 лет	t-эмп.	p
Активное - пассивное отношение к жизненной ситуации	44,59	26,48	8,30	0,001
Бодрость - уныние	47,90	29,90	6,86	0,001
Тонус высокий - низкий	44,50	28,00	7,21	0,001
Раскованность - напряженность	38,20	30,19	2,78	0,05
Спокойствие - тревога	42,40	29,50	5,20	0,001
Устойчивость - неустойчивость эмоционального состояния	36,20	27,90	3,36	0,01
Удовлетворенность - неудовлетворенность жизнью	37,00	28,57	3,20	0,01
Критическое - некритическое отношение к себе	48,82	36,76	5,62	0,001




Рис.3. Результаты диагностики особенностей самооценки больных с различным стажем злоупотребления алкоголем




Рис.4. Результаты диагностики личностной тревожности больных с различным стажем злоупотребления алкоголем





Рис.5. Результаты исследования преобладающих стратегий социальной адаптации больных с различным стажем злоупотребления алкоголем

Основная группа



Контрольная группа



Рис. 6. Результаты сравнения основной и контрольной групп больных алкоголизмом по клиническому состоянию




Рис.7. Динамика психических состояний больных алкоголизмом




Рис. 8. Динамика особенностей самоотношения больных алкоголизмом до и после психотерапевтической коррекции




Рис. 9. Распределение мотивов употребления алкоголя больными с разным стажем зависимости до начала лечения




Рис. 10. Распределение мотивов воздержания от употребления алкоголя больными с разным стажем зависимости до начала лечения

The background features abstract, flowing shapes in shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The colors transition from deep blue on the left to bright white on the right.

Спасибо за внимание!