



ТРИ ВАЖНЫХ ПОЗИЦИИ ТРАКТОВКИ ДАННЫХ ЭФГДС В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА

Доцент кафедры педиатрии №1
ФГБОУ ВО «ДОНГМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО» МЗ РФ
Островский И.М.

Позиция 1

Последние два десятилетия, в связи с внедрением ЭФГДС и УЗИ, традиционный метод оценки функции желудка (фракционное исследование желудочного сока) близок к исчезновению. Вместе с ним **утрачена возможность определения кислотообразующей функции**, в первую очередь **возможность выявлять гипоацидоз**.

Позиция 1

Сопутствующая ЭФГДС рН-метрия определяет только тощачковую кислотность, что, конечно, позволяет выявить гиперацидоз, но не в состоянии определить гипоацидность, поскольку не исследуется кислотообразование после стимуляции.

Позиция 2

Большим преимуществом ЭФГДС является возможность выявить эндоскопические признаки гастрита (геморрагии, эрозии, атрофию, заброс желчи, другие изменения слизистой (кроме гиперемии), а также эзофагита и дуоденита.

Позиция 2

При отсутствии эндоскопических признаков гастрита теоретически, возможна биопсия с последующей гистологией для достоверной диагностики воспаления. Но для этого нужно объединить усилия эндоскопистов и патоморфологов, что удается крайне редко. Поэтому в отсутствие эндоскопических признаков гастрита выставляется аморфный диагноз «функциональная диспепсия».

Позиция 3

Наконец, «быстрый уреазный тест». Рекомендуют забор материала проводить из нескольких (до шести) мест.

Большинство же эндоскопистов (по крайней мере в Донецке) ограничиваются... одним. При этом возрастает вероятность ложноотрицательных результатов, что в итоге приводит к гиподиагностике хеликобактериоза.



Позиция 3

Поэтому в случае выраженной гиперацидности, при положительном семейном анамнезе, при наличии эрозий, заброса желчи и т.п. приходится назначать уреазный дыхательный тест. И почти в половине случаев он оказывается положительным.



PS

В каких случаях можно обойтись без ЭФГДС?

Если у ребенка со стандартными жалобами без «симптомов тревоги» выявили хеликобактериоз неинвазивным способом, то, следуя принципу «test & treat», ему можно назначить тройную терапию без ЭФГДС. И только в случае неэффективности последней – провести эндоскопию.



Спасибо за внимание!

➤ Обратная связь - +79493508494