

Контагиозный моллюск в области гениталий

Боряк С.А.

доцент кафедры дерматовенерологии и
косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Донецк

08 июня 2022г.

Контагиозный моллюск –

- доброкачественное вирусное заболевание человека, характеризующееся появлением на коже (реже на слизистых оболочках) полушаровидных восковидных папул с центральным пупковидным вдавлением, содержащих желтовато-белый детрит

Классификация ЗППП (по ВОЗ)

I. Классические венерические болезни

- сифилис;
- гонорея;
- мягкий шанкр;
- лимфогранулематоз паховый;
- гранулема венерическая.

Классификация ЗППП (по ВОЗ)

продолжение

II. Инфекции, передающиеся половым путем, с преимущественным поражением половых органов

- мочеполовой трихомониаз;
- мочеполовой хламидиоз;
- кандидозные заболевания (вульвовагиниты и баланопоститы)
- мочеполовой микоплазмоз;
- генитальный герпес;
- остроконечные бородавки;
- **генитальный контагиозный моллюск;**
- гарднереллез;
- урогенитальный шигеллез гомосексуалистов;
- лобковый педикулез;
- чесотка

Классификация ЗППП (по ВОЗ)

продолжение

III. Инфекции с преимущественным поражением других органов, способные передаваться половым путем (не относятся к венерическим болезням)

- инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;
- гепатит В;
- лямблиоз;
- амебиаз;
- цитомегаловирусная инфекция.

Эпидемиология генитального контагиозного моллюска

- Пик заболеваемости приходится на возраст максимальной сексуальной активности
- Мужчины болеют в 2 раза чаще женщин
- Обильные, часто рецидивирующие высыпания контагиозного моллюска характерны для пациентов с иммуносупрессией
- Распространенность контагиозного моллюска у ВИЧ-инфицированных составляет 5-18%, при СПИДе – до 33%

Этиология, патогенез

- Заболевание вызывает вирус контагиозного моллюска (MCV – *Molluscum contagiosum virus*) семейства *Poxviridae* рода *Molluscipoxvirus*
- MCV вызывает заболевание только у человека
- MCV размножается в пределах эпидермиса
- Инкубационный период заболевания – от 1 недели до 6 месяцев, в среднем 2-7 недель

Клиническая картина



Атипичные формы контагиозного моллюска

- Гигантская
- Сгруппированная
- Милиумподобная
- Педикулярная
- Акнеформная
- Фолликулитоподобная
- Фурункулоподобная

Диагноз контагиозного моллюска обычно устанавливается:

на основании клинических проявлений +

дерматоскопия +

микроскопия содержимого узелков

(при необходимости) +

патоморфологическое исследование биоптатов кожи *(при необходимости)*

Рекомендуемые клинические исследования при гЕНИТАЛЬНОМ контагиозном моллюске

- Серологические исследования на:
 - сифилис;
 - ВИЧ;
 - гепатиты В и С.
- Обследование на урогенитальные инфекции:
 - мазки из уретры, влагалища, шейки матки;
 - соскоб из уретры, шейки матки;
 - ПЦР из уретры, шейки матки, влагалища



Спасибо за внимание