



# СЛУЧАЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ МИКОТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У БОЛЬНОЙ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

П.В. ЛОГУНОВ,

К.МЕД.Н. С.А. ЗМАРАДА.

21 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. ДОНЕЦК

# Данные анамнеза

- ▶ Больная Х., 1954 г.р.
- ▶ Рак правой молочной железы, люминальный тип А, T2N0M0 состояние после радикальной мастэктомии в 2010 году
- ▶ Появление высыпаний более 3х месяцев назад в области послеоперационного рубца груди справа, зуд
- ▶ Периодические высыпания в течение 5 лет, связывает с обострением поллиноза
- ▶ Мать болела сахарным диабетом второго типа

# Клиническая картина

- ▶ Патологический процесс носит распространенный характер, локализуется на коже груди в области послеоперационного рубца справа и в левой переходной складки, где представлен в виде ложно-эволюционной полиморфной сыпи, папуло-везикулезного характера, на фоне резко отграниченной эритемы красного цвета, местами мокнутие по типу «серозных колодцев», микроэрозии и белесоватый налет по периферии
- ▶ На коже голеней и плеч высыпания в виде макулезной сыпи розово-красного цвета, округлой формы, до 2-4 см в диаметре, на фоне сухой кожи с единичными эксфолиациями на поверхности

# План обследования

- ▶ Общеклинический и биохимический анализ крови
- ▶ Анализ крови на уровень глюкозы, гликированный гемоглобин, инсулин, индекс НОМА
- ▶ Дерматоскопия
- ▶ Биопсия кожи
- ▶ Консультация эндокринолога
- ▶ Микроскопическое и бактериоскопическое исследование кожи

# Диагноз на основании обследований

- ▶ Основной: Хроническая распространенная микробная экзема в стадии обострения, осложненная кандидозной инфекцией
- ▶ Сопутствующий: Сахарный диабет 2-ого типа средней степени тяжести, стадия медицинской компенсации, ожирение 2-ой степени, алиментарно-конституциональный тип

# Лечение

- ▶ Дезлоратадин 5 мг – 1 раз в сутки – вечером, до 14 дней.
  - ▶ Реосорбилак – 200 мл, внутривенно, капельно – 1 раз в сутки – 5 дней,
  - ▶ Тиосульфат Na 30% 5 мл, внутривенно – 1 раз в сутки – 5 дней.
  - ▶ Метформин – 500 мг. - 1 таб. – 2 раза в день, до еды – 3 месяца;
  - ▶ Наружная терапия: крем Пимафукорт – 2 раза в сутки – 7 дней,
  - ▶ ежедневная смена, стирка и обработка паром нательного белья, ношение нижнего белья из натуральных тканей.
- 
- ▶ **Рекомендации и режим:**
    - Диета с исключением высокоуглеводистых продуктов, снижение массы тела,
    - контроль уровня глюкозы 1 раз в месяц, натошак,
    - повторная консультация эндокринолога через 2 месяца.

# Заключение

- ▶ Особенность клинического случая - коморбидность аллергодерматозов, осложненных вторичной микотической инфекцией у больных сахарным диабетом после оперативного лечения в связи с неоплазией молочной железы
- ▶ Комплекс и порядок диагностических мероприятий и мультидисциплинарный подход позволяют быстро и объективно установить диагноз и провести эффективную терапию без госпитализации
- ▶ Быстрое исчезновение островоспалительных явлений при своевременной диагностике и лечении аллергодерматоза у больной с отягощенным онкологическим и эндокринологическим анамнезом позволил восстановить качества жизни пациента