

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ФИПО

Особенности алопеции при атопическом дерматите и при сифилисе

доц. Тахташов И. Р.

г.Донецк
21.09.2022 г.

Актуальность

Атопический дерматит - хроническое аллергическое лихенифицирующее заболевание кожи, которое в типичных случаях начинается в раннем детском возрасте и приводит к физической и эмоциональной дезадаптации пациента и членов его семьи.

Сопровождается кожным зудом, частым инфицированием. Нередко протекает с выпадением волос.

Распространенность

Распространенность заболевания значительно возросла за последние три десятилетия и составляет в развитых странах от 10 до 15% у детей в возрасте до 5 лет и от 15 до 20% у школьников.

В структуре аллергических заболеваний его доля составляет 50 -75%.

Выпадение волос при атопическом дерматите бывает

- • Тотальным
- • Крупноочаговым
- • Мелкоочаговым
- • Смешанным

Сифилитическая алопеция

Подобные проявления характерны и для сифилиса.

Сифилитическая алопеция типична для вторичного рецидивного сифилиса, хотя иногда может возникнуть и при вторичном свежем сифилисе.

Сифилитическая алопеция

(продолжение)

Различают

- Диффузную (*alopecia syphilitica diffusa*)
- Мелкоочаговую (*alopecia syphilitica areolaris*),
- Смешанную (*alopecia syphilitica mixta*) сифилитическую алопецию.

У разных пациентов этот симптом сифилиса выражен в разной степени. Иногда он протекает почти незаметно.

Диффузное облысение при сифилисе

- Выпадение волос возникает внезапно.
- На коже в проблемной зоне нет никаких признаков воспаления: отсутствует покраснение, сыпь, шелушение или какие-либо субъективные ощущения.
- Вначале выпадают волосы на висках.
- Постепенно алопеция распространяется по всей поверхности головы
- Исчезают даже пушковые волосы.

Мелкоочаговая алопеция при сифилисе

- на волосистой части головы, на висках и затылке, реже на бороде, бровях и ресницах, множество мелких, до 1-2 см и меньше в диаметре очагов облысения.
- округлые очертания и обычно не сливаются между собой.
- выпадают не все волосы, поэтому волосистая часть головы приобретает сходство с мехом, изъеденным молью.
- выпадение волос в форме мелких очагов на бровях называют «омнибусным» (*Fournier*) или «трамвайным» (П.С. Григорьев) сифилидом
- вследствие частичного выпадения и последовательного отрастания ресницы имеют разную длину (признак Пинкуса)

Смешанная алопеция при сифилисе

Объединяет в себя обе формы диффузного и очагового выпадения волос

Тактика ведения пациентов

При обнаружении облысения необходимо:

- тщательно собрать анамнез (при необходимости, и половой);
- произвести осмотр всех кожных и видимых слизистых покровов;
- произвести забор и исследование крови на КСР, МРП, РИФ-200, РИФ-абс.

Прогноз

Прогноз сифилитической алопеции благоприятный.

Сифилитическое облысение без специфического лечения может существовать долго, затем волосы полностью отрастают в течение нескольких месяцев.

Противосифилитическое лечение через 10-15 дней прекращает выпадение волос, которые полностью отрастают через 1,5-2 месяца

Спасибо за внимание