

Роль антидепрессантов в лечении стресс-индуцированных дерматозов

Доц. Боряк С.А., доц. Провизион А.Н.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Донецк 18 января 2023г.

Психотропные средства в дерматологии

- Устраняют психопатологические нарушения у определенных категорий пациентов
- Оказывают вегетостабилизирующее действие
- Нормализуют сон, аппетит
- Некоторые оказывают выраженное противозудное действие

ТАКИМ ОБРАЗОМ:

-существенно улучшают качество жизни

-вырабатывают позитивную мотивацию на проводимую терапию в целом

Группы психотропных средств, используемых в дерматологии

- Анксиолитики
- Седативные средства (в т.ч. комбинированные)
- Транквилизаторы
- Антидепрессанты

Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. А.В.Самцова, Е.В.Соколовского. – Москва: Литтерра, 2021. – 992 с.

Антидепрессанты

- Применяют в дерматологии при психосоматических, в т.ч. стресс-индуцированных, дерматозах
- Чаще всего применяют трициклический антидепрессант **АМИТРИПТИЛИН** – неселективный ингибитор обратного захвата моноаминов, обладает выраженным анксиолитическим действием

Терапевтический справочник Вашингтонского университета: Пер. с англ./ Под ред. М. Вудли, А. Уэлан. – М.: Практика, 1995. – 832 с., ил.

Показания к назначению амитриптилина

- Депрессивные состояния, сопровождающиеся возбуждением и нарушениями сна
- Панические атаки
- Хронический болевой синдром

Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. А.В.Самцова, Е.В.Соколовского. – Москва: Литтерра, 2021. – 992 с.

Форма выпуска амитриптилина

- Таблетки по 0,025г
- Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 0,01 и 0,025г
- Раствор для в/в и в/м введения 1%, ампулы по 2мл



Способ применения

ТАБЛЕТКИ:

- Принимают внутрь, не разжевывая, сразу после еды
- **Взрослым:** начальная суточная доза – 25-50мг, разделенная на 2 приема , или в виде однократного приема перед сном
- При необходимости суточную дозу можно постепенно увеличивать до 200мг
- Общий курс лечения – 6 месяцев и более

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ:

- в/м - начальная доза составляет 50-100мг/сут. в 2-4 введения. При необходимости дозу можно постепенно увеличить до 300мг/сут., в исключительных случаях - до 400мг/сут.

Применение amitriptyline у пожилых

- Рекомендуемая нагрузочная доза для пожилых – 25-30 мг в сутки, обычно однократно (на ночь)
- В дальнейшем дозу следует повышать постепенно, через сутки, при необходимости – до 50-100 мг/сут., до получения эффекта
- После достижения терапевтического эффекта переходят на минимально эффективные дозы – 25-50 мг/сут.

Применение amitriptyline у детей

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ: детский возраст до 6 лет (для приема внутрь таблеток), детский возраст до 12 лет (для в/м и в/в введения)

Применение amitriptyline при беременности и в период лактации

- Amitriptyline не следует применять при беременности, особенно в I и III триместрах, за исключением случаев крайней необходимости
- Прием amitriptyline следует постепенно отменить, по крайней мере, за 7 недель до ожидаемых родов во избежание развития синдрома отмены у новорожденного.
- В экспериментальных исследованиях amitriptyline оказывал тератогенное действие.
- Противопоказан в период лактации. Выделяется с грудным молоком и может вызывать сонливость у грудных детей.

Особые указания

- **При наличии нарушений функции почек:**
препарат можно применять в обычной дозе
- **У пациентов с печеночной недостаточностью:**
дозу amitriptyline необходимо уменьшить

Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. А.В.Самцова, Е.В.Соколовского. – Москва: Литтерра, 2021. – 992 с.

Особые указания (продолжение)

- В период лечения в отдельных случаях могут развиваться агранулоцитоз или гипокалиемия, поэтому рекомендовано проверять периферическую кровь, особенно при повышении температуры тела, развитии гриппоподобных симптомов и тонзиллита.
- При длительной терапии необходимо контролировать функции сердечно-сосудистой системы и печени

Особые указания (продолжение)

- У пожилых пациентов и пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует контролировать ЧСС, АД, ЭКГ. На ЭКГ возможно появление клинически **незначимых** изменений (сглаживание зубца Т, депрессия сегмента ST, расширение комплекса QRS)
- **В период лечения необходимо исключить употребление алкоголя!**

Особые указания (продолжение)

- В период лечения в некоторых случаях могут развиваться мидриаз, тахикардия, задержка мочи, сухость слизистых оболочек, снижение моторной функции кишечника
- Возможны судороги, повышение температуры тела. В дальнейшем возможно резкое угнетение функции ЦНС, нарушение сознания и дыхательная недостаточность

Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. А.В.Самцова, Е.В.Соколовского. – Москва: Литтерра, 2021. – 992 с.

Особые указания (продолжение)

- Отменять амитриптилин следует **постепенно**, так как при внезапном прекращении приема после длительного лечения, особенно в **высоких дозах**, возможно развитие синдрома **отмены**

Терапевтический справочник Вашингтонского университета: Пер. с англ./ Под ред. М. Вудли, А. Уэлан. – М.: Практика, 1995. – 832 с., ил.

*СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!*

