

# **Патология репродуктивной сферы при ранних акне у девочек**

**Докладчик:**

**Лукьянченко Елена Николаевна**

**к.мед.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО  
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО**

**Главный врач центра медицинской косметологии Global Medical Group**

## Распределение сопутствующей патологии у пациенток с ранними акне

- При анализе сопутствующей патологии у больных с РА было выявлено, что среди заболеваний желудочно-кишечного тракта чаще были хронические гастриты и патология кишечника – у 18 (60%) и у 14 (46,6%) соответственно

## Распределение сопутствующей патологии у пациенток с ранними акне

- При РА у каждой второй пациентки наблюдалась дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) – у 16 (53,3%)
- Холецистит отмечался в 2х группах обследованных больных одинаково часто - у 4 (13,3%) из 30 РА

## Распределение сопутствующей патологии у пациенток с ранними акне

- Патология щитовидной железы встречалась у 18 (60%) больных с РА
- Заболевания бронхолегочной системы – у 3 (10%)
- Патология мочевыделительной системы – у 4 (13,3%)

## Распределение сопутствующей патологии у пациенток с ранними акне

Сопутствующая патология	Всего		Ранние акне		Поздние акне	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
<b>Желудочно-кишечный тракт:</b>	27	30%	18	60%	9	15%
хронический гастрит	12	13,3%	4	13,3%	8	13,3%
холецистит	36	40%	16	53,3%	20	33,3%
ДЖВП	24	26,7%	14	46,6%	10	16,67%
патология кишечника						%
<b>Щитовидная железа</b>	33	36,67%	18	60%	15	25%
<b>Мочевыделительная система</b>	11	12,2%	4	13,3%	7	11,67%
<b>Бронхо -легочная система</b>	5	5,55%	3	10%	2	3,33%
<b>Сердечно-сосудистая система</b>	7	7,77%	0	0	7	11,67%
<b>Гипоталамо-гипофизарный надпочечниковый синдром</b>	3	3,33%	0	0	3	5%


# Структура экстрагенитальной патологии в обследованных группах при РА



## Патология органов репродуктивной сферы у больных с РА

- У всех 30 пациенток с РА были нарушения менструального цикла (НМЦ),
- у 4 (13,3%) - синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

# Патология органов репродуктивной сферы у больных с РА





## ВЫВОДЫ

- Таким образом, проведенные исследования выявили особенности клинических проявлений при РА в зависимости от наличия коморбидной патологии, что необходимо учитывать при планировании лечебно-диагностических и реабилитационных программ.

Мои контакты:

0713591264

[lenatravel@mail.ru](mailto:lenatravel@mail.ru)

**Благодарю за внимание!**