

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ РЕГРЕССА АКНЕ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

БОГОСЛАВ Ю.П., ЧЕРНОУС В.В., ЧУРИЛОВ А.А.

*ГОО ВПО «Донецкого национального медицинского
университета имени М. Горького», кафедра
акушерства и гинекологии
Медицинский центр «Красота и здоровье»
8 февраля 2023 г. Донецк*

Основные патогенетические механизмы акне

Нарушение микробного пейзажа кожи (уменьшение количества нормальных бактерий и увеличение патогенных)

Гормональные нарушения (повышение мужских гормонов, гормона роста, прогестерона, кортизола) и их последствия:

Гиперсекреция сальных желез (увеличение продукции и изменение биохимии секрета)

Гиперкератоз протоков сальных желез

Снижение местного иммунитета и др.

Основные направления коррекции гормонального фона:

- ▣ Антиандрогенная терапия (стероидные и нестероидные препараты)
- ▣ Гормональные контрацептивы с антиандрогенным действием
- ▣ Препараты седативного действия и другие препараты, снижающие выработку кортизола
- ▣ Блокаторы андрогенных рецепторов

Гормональные препараты с антиандрогенной активностью:

Таблица 1. Фармакологические свойства прогестерона и некоторых синтетических гестагенов


Название препарата, содержащего гестаген	Гестагенная активность	Андрогенная активность	Антиандрогенная активность	Антиминерало-кортикоидная активность	Кортикоидная активность
Прогестерон	+	–	(+)	+	–
Дроспиренон	+	–	+	+	–
Ципротерон ацетат	+	–	+	–	(+)
Дезогестрел	+	(+)	–	–	–
Диеногест	+	–	+	–	–
Гестоден	+	(+)	–	(+)	–
Левоноргестрел	+	(+)	–	–	–
Норгестимат	+	(+)	–	–	–

+ – наличие эффекта; (+) – незначительный эффект в терапевтических дозах; – отсутствие эффекта

Диеногест – прогестаген, обладающий выраженными антипролиферативными и антиандрогенными свойствами, что делает его препаратом выбора для лечения эндометриоза

ГЕСТАГЕНЫ С АНТИАНДРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ


Антиандрогенная активность гестагенов при исследованиях на млекопитающих





Assessed using Hershberger test (rodent seminal vesicle hypertrophy test)

Антиандрогенная активность диеногеста составляет 40% активности ципротерона, при этом препарат не обладает глюкокортикоидным действием, что делает перспективным применение препарата для лечения акне

Dienogest



Препараты, содержащие диеногест




Клинические примеры:

- ▣ 1. Н, 26 лет, направлена хирургом после оперативного лечения по поводу эндометриоза толстой кишки (глубокая инфильтративная форма наружно-внутреннего эндометриоза, выполнена резекция кишечника), назначен диеноргест 2 мг в день 3 месяца;
- ▣ На фоне лечения отмечается нормализация гинекологического статуса и регресс акне



до



после



- 2. Пациентка Е., 21 год, наружный эндометриоз (эндометриома правого яичника). Сопутствующий: акне, средней тяжести.
- Назначен диеногест 2 мг в день – 3 месяца. После лечения отмечается уменьшение болей, кисты яичника, регресс акне. Назначен КОК содержащий диеногест



▣ 3. Пациентка В, 22 года, обратилась по поводу бесплодия. Диагноз: наружный эндометриоз 4 ст, спаечная болезнь органов малого таза. Первичное бесплодие. Сопутствующий: акне средней тяжести.

Назначен диеногест в дозе 2 мг 3 месяца, выполнено хирургическое лечение.

На фоне лечения отмечался регресс акне.


После лечения наступила беременность



до



после



Выводы:

- ▣ Таким образом, применение диеногеста у женщин с эндометриозом, помимо основного действия оказывает выраженный положительный клинический эффект в лечении акне, что делает перспективным применение как диеногеста, так и гормональных контрацептивов, содержащих диеногест в лечении акне у женщин различных возрастных групп. При сочетании акне с эндометриозом любой локализации препараты, содержащие диеногест можно считать средствами первого выбора.

Благодарю за внимание!

Медицинский центр



*Доктора Медицинских Наук
Богослав Юлии Петровны*

Богослав Юлия Петровна – доктор
медицинских наук, доцент кафедры
акушерства и гинекологии
+7 949 4700686
+7 949 3422 161