

# Клинико-эпидемиологические особенности ИППП у подростков

**Боряк С.А.**  
доцент кафедры  
дерматовенерологии и косметологии ФИПО  
ФГБОУ ВО «ДонГМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО» МЗ РФ

Донецк 14 июня 2023г.

## Актуальность

- Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), отнесены к группе болезней социального неблагополучия
- Они являются важнейшей медико-санитарной проблемой в связи с тяжёлыми последствиями, влияющими на состояние здоровья населения
- Заболеваемость ИППП подростков сохраняется на достаточно высоком уровне

Заргарова А.Э., 2Владимилова Е.В., 2Владимиров В.В. и др. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. – электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения» - № 5 2018 (63)

Основные  
социальные  
группы  
подростков с  
ИППП


- Неорганизованные
- Учащиеся школ
- Учащиеся средних профессиональных учебных заведений

Основные  
факторы риска  
заражения  
ИППП у  
подростков

- Снижение возраста сексуального дебюта (до 14-16 лет)
- Низкая информированность подростков по вопросам профилактики ИППП
- Употребление психоактивных веществ

Рахматулина М.Р. Повышение качества оказания специализированной медицинской помощи детям с урогенитальными инфекциями. – Автореферат диссерт. на соискание уч.ст.д.мед.н. – Москва, 2009. – 42 с.

Заболеваемость  
ИППП у  
подростков в  
зависимости от  
пола




Наибольший  
удельный вес  
составляли у  
подростков:

- Урогенитальный хламидиоз (26,9%)
- Трихомониаз (19,4%)
- Гонококковая инфекция (11,4%)
- Сифилис (12,2%)

Плешков П.В., Динамика заболеваемости ИППП у подростков России.  
– Интернет-ресурс

# Заболеваемость сифилисом у подростков



■ городское население    ■ сельское население

## Клинические аспекты ИППП у подростков

- У абсолютного большинства подростков наблюдается длительное течение заболевания
- Более 50% подростков с ИППП были инфицированы неоднократно
- У 1/3 подростков диагностируют 2 и более ИППП
- Заболевание чаще протекает в скрытой форме

Клинические  
аспекты ИППП у  
подростков  
(продолжение)

- При обследовании часто регистрируются признаки восходящего воспалительного процесса уrogenитального тракта (боли внизу живота, в промежности; контактные кровотечения у девушек)
- У 60% девушек присутствуют объективные признаки вульвовагинита, хронического эндоцервицита

## Антибиотико- резистентность!!!

- У подростков довольно часто отмечается устойчивость микроорганизмов – возбудителей ИППП (в частности - гонореи) к ряду антибиотиков:
  - пенициллин;
  - тетрациклины;
  - фторхинолоны.

Рахматулина М.Р. Повышение качества оказания специализированной медицинской помощи детям с урогенитальными инфекциями. – Автореферат диссерт. на соискание уч.ст.д.мед.н. – Москва, 2009. – 42 с.

**Спасибо за внимание!**