

Особенности косметологической помощи у пациентов с псориазом

к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии и косметологии


Лукьянченко

Елена Николаевна

15 ноября 2023 г. Донецк

Псориаз — системное иммуноассоциированное заболевание мультифакторной природы с доминирующим значением генетических факторов, характеризующееся:


- ускоренной пролиферацией эпидермоцитов;
- нарушением их дифференцировки;
- иммунными реакциями в дерме и синовиальных оболочках;
- дисбалансом между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, хемокинами;
- частыми патологическими изменениями опорно-двигательного аппарата


- 
- **Псориаз** – один из самых распространенных хронических дерматозов, встречается у детей и у взрослых, у мужчин и у женщин, имеет рецидивирующее течение с различной продолжительностью ремиссии


В период ремиссии пациенты могут обращаться за косметологической помощью

При ведении таких пациентов косметолог должен учитывать, что:

- при псориазе поражаются многие органы и системы
- может быть коморбидная и разнообразная полиморбидная патология
- при прогрессировании процесса может быть изоморфная реакция Кебнера при травмировании видимо непораженной кожи (любое инвазивное косметологическое вмешательство)

- 
- Выбор вида, объема и последовательности проведения косметологических процедур определяется наличием или отсутствием псориатического анамнеза, наличием псориаза в текущее время, имеющейся сопутствующей патологией и получаемых лекарственных препаратов в настоящее время

- 
- Наличие активных псориатических высыпаний является противопоказанием для любых инвазивных косметологических процедур
 - В период ремиссии объем, вид и особенности косметологических процедур зависят от формы псориаза, сезонности процесса, наличия коморбидной или полиморбидной патологии



Избежать осложнений в этих случаях позволяет соблюдение принципа ООО:

- опрос и анализ анамнеза
- осмотр всего кожного покрова, в том числе волосистой части головы, крупных складок, перианальной зоны, ногтевых пластинок
- обследование и анализ медицинской документации



Меры предосторожности

1. Избегать грубого механического воздействия на кожу
реакция Кебнера может возникнуть при пилинге, ручной чистке лица, мезотерапии роллером, вакуумном массаже, татуаже бровей, а в редких случаях и после инъекций

2. Лазерные и фотопроцедуры, нагревание могут способствовать развитию ожогов у пациентов с «летним» типом псориаза. Но даже у пациента с «зимним» типом возможно повреждение кожи лазером или ультрафиолетовым излучением

3. Следить за соблюдением асептики

Нельзя допустить попадания инфекции на травмированные участки кожи

Инъекционные процедуры при псориазе

- инъекционные процедуры во время обострения псориаза противопоказаны
- в зонах с активными высыпаниями процедуры могут привести к осложнениям
- некоторые инъекционные препараты в высоких дозах могут спровоцировать иммунный ответ
- механическое повреждение иглой может вызвать реакцию Кебнера
- Положительное влияние на течение псориаза оказывают инъекции ботулотоксина

Пилинг при псориазе

Псориаз повышает риск неблагоприятных исходов процедуры пилинга:

- обострения болезни
- слишком выраженного или длительного покраснения
- медленного заживления
- гиперчувствительности
- По большей мере это относится к глубоким пилингам, которые требуют более бережного исполнения и долгого восстановительного срока



Спасибо за внимание!