

**Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение
Высшего Образования Донецкий Государственный Медицинский
Университет им.М.Горького Минздрава России
Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО**

Анализ дерматологической патологии у онкологических больных

13 декабря 2023 г. Донецк

**Исполнитель:
студентка 6 курса
2 лечебного факультета 3
группы
Кичигина Елизавета
Владимировна**

**Научный руководитель:
д.м.н,проф.
Проценко Татьяна
Витальевна**

Цель

Изучить состояние кожи и её
придатков (волосы, ногти),
дерматологический и
аллергологический анамнез у
онкологических больных

Материалы и методы

- Под наблюдением было 30 больных, в т.ч. 12 (40%) мужчин и 18 (60%) женщин в возрасте от 23 до 88 лет
- При осмотре и опросе изучали:
 - состояние кожи (высыпания на лице, теле, руках)
 - состояние волос (выпадение волос, наличие перхоти)
 - состояние ногтей
 - наличие зуда
 - аллергологический и дерматологический анамнез
 - антропометрические данные с вычислением индекса массы тела

Возрастной анализ

- При возрастном анализе отмечено, что преобладали пациенты старше 60 лет - 11 (36,7%) и меньше всего пациентов было в возрасте 21-30 лет - 4 (13,3%); в возрасте 31-40 лет было - 4 (13,3%); в возрасте 41-50 лет - 5 (16,7%) и в возрастной группе 51-60 лет - 6 (20%)

Гендерно-возрастной анализ

При анализе пола и возраста отмечено, что:

- В возрастной группе 21-30 лет было - 2 (16,7%) мужчины и 2 (11,1%) женщины
- 31-40 - 2 (16,7%) мужчины и 2 (11,1%) женщины
- 41-50 - 2 (16,7%) мужчины и 3(16,7%) женщины
- 51-60 - 3 (25%) мужчины и 3 (16,7%) женщины
- Старше 60 - 3 (25%) мужчины и 8 (44,4%) женщин

Выпадение волос до начала терапии

- Выпадение волос до начала хирургического лечения, химио- и лучевой терапии было у 7 (23,3%) больных, при этом преобладали больные старше 60 лет - 4 (13,3%), выпадение волос не было отмечено в возрастных группах 21-30 лет - 0 (0%) и 31-40 лет - 0 (0%)
- 21-30 - 0 (0%) мужчин и 0 (0%) женщин
- 31-40 - 0 (0%) мужчин и 0 (0%) женщин
- 41-50 - 1 (8,3%) мужчина и 0 (0%) женщин
- 51-60 - 1 (8,3%) мужчина и 1 (5,5%) женщина
- Старше 60 - 1 (8,3%) мужчина и 3 (16,7%) женщины

Из 30 больных - 7 (23,3%) отметили выпадение волос до начала терапии, наблюдалось чаще у женщин - 4 (13,3%), чем у мужчин - 3 (10%)

Выпадение волос: очаговое и диффузное

- При анализе выпадения волос было отмечено, что очаговое выпадение преобладает у пациентов старше 60 лет - 4 (13,3%) и не было у пациентов 21-30 лет - 0 (0%). У пациентов 31-40 лет - 2(6,7%). У пациентов возрастных групп 41-50 лет, 51-60 лет - 1(3,3%)
- 21-30 - 0 мужчин (0%) и 0 женщин (0%)
- 31-40 - 1 мужчина (0%) и 1 женщина (5,5%)
- 41-50 - 1 мужчина (8,3%) и 0 женщин (0%)
- 51-60 - 0 мужчин (0%) и 1 женщина (5,5%)
- Старше 60 - 1 мужчина (8,3%) и 3 женщины (16,7%)
- Выпадение волос по всей поверхности головы преобладает так же у пациентов старше 60 лет- 6 (20%) и не было отмечено у возрастных групп 21-30 лет, 41-50 лет 0 (0%). У пациентов 31-40 лет - 2 (6,7%). У пациентов 51-60 лет - 4 (13,3%)
- 21-30 - 0 мужчин (0%) и 0 женщин (0%)
- 31-40 - 1 мужчина (8,3%) и 1 женщина (5,5%)
- 41-50 - 0 мужчин (0%) и 0 женщин (0%)
- 51-60 - 3 мужчины (25%) и 1 женщина (5,5%)
- Старше 60 - 2 мужчины (16,7%) и 4 женщины (22,2%)

Из 30 опрошенных: 12 (40%) больных отмечают выпадение волос по всей поверхности головы, а так же 8 (26,7%) больных отмечают очаговое выпадение волос. Диффузное выпадение волос одинаково встречалось и у женщин - 6 (20%) и у мужчин - 6 (20%) . Очаговое выпадение волос встречалось чаще у женщин - 5 (16,7%), чем у мужчин - 3 (10%).

Выпадение волос в виде «залысин»

Выпадение волос в виде «залысин» отметили 8 (26,7%) больных из 30 опрошенных, одинаково часто как мужчины - 4 (13,3%), так и женщины - 4 (13,3%)

Наличие перхоти

Из 30 опрошенных наличие перхоти отметили 23 (76,7%) пациента, чаще женщины - 12 (40%), чем мужчины - 11 (36,7%)

Наличие зуда

- При анализе больных с кожными онкологическими заболеваниями отмечено, что зуд преобладает у больных старше 60 лет - 5 (16,7%), меньше всего в возрастных группах 21-30 лет, 31-40 лет, 51-60 лет - 1 (3,3%). У больных 41-50 лет - 3 (10%)
- 21-30 - 1 (8,3%) мужчина и 0 (0%) женщин
- 31-40 - 0 (0%) мужчин и 1 (5,5%) женщина
- 41-50 - 1 (8,3%) мужчина и 2 (11,1%) женщины
- 51-60 - 1 (8,3%) мужчина и 0 (0%) женщин
- Старше 60 - 1 (8,3%) мужчина и 4 (22,2%) женщины

Из 30 опрошенных наличие зуда отметили 11 (36,7%) больных, наблюдалось чаще у женщин - 7 (23,3%), чем у мужчин - 4 (13,3%)

Наличие проблем с ногтями

- При анализе было отмечено, что проблемы с ногтями преобладают у больных старше 60 лет - 4 (13,3%) и не зафиксированы в возрасте 51-60 лет (0%). В возрастных группах 31-40 лет - 1 (3,3%), 41-50 лет - 2 (6,7%), 21-30 лет - 3 (10%).
- 21-30 - 2 (16,7%) мужчины и 1 (5,5%) женщина
- 31-40 - 1 (8,3%) мужчина и 0 (0%) женщин
- 41-50 - 2 (16,7%) мужчины и 0 (0%) женщин
- 51-60 - 0 (0%) мужчин и 0 (0%) женщин
- Старше 60 - 2 (16,7%) мужчины и 2 (11,1%) женщины

Из 30 опрошенных наличие проблем с ногтями отметили 10 (33,7%) больных, наблюдалось чаще у мужчин - 7 (23,3%), чем у женщин - 3 (10%)

Высыпания на лице в анамнезе

Из 30 опрошенных высыпания на лице отмечали 11 (36,7%) больных, чаще женщины - 8 (26,7%), чем мужчины - 4 (13,3%)

Аллергические заболевания

- При анализе аллергические заболевания чаще преобладали у больных в возрасте 51-60 лет - 4 (13,3%), меньше всего в возрастных группах 21-30 лет, 31-40 лет, 41-50 лет - 1 (3,3%). У больных старше 60 лет - 3 (10%).
- 21-30 - 1 (8,3%) мужчина и 0 (0%) женщин
- 31-40 - 0 (0%) мужчин и 1 (5,5%) женщина
- 41-50 - 0 (0%) мужчин и 1 (5,5%) женщина
- 51-60 - 1 (8,3%) мужчина и 3 (16,7%) женщины
- Старше 60 - 1 (8,3%) мужчина и 2 (11,1%) женщины

Из 30 опрошенных, аллергические заболевания в анамнезе отмечали 10 (33,3%) больных, чаще женщины - 7 (23,3%), чем мужчины - 3 (10%)

Выводы

Таким образом, у онкологических больных отмечена разнообразная патология кожи и ее придатков, что необходимо учитывать при последующем ведении пациентов

Спасибо за
внимание!