

Анализ дерматологической патологии у терапевтических больных (по данным анкетирования)

Исполнитель Кузьменко Е.М.

Научный руководитель проф. Проценко Т.В.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО

ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Цель исследования: изучить распространенность дерматологической патологии и эстетических проблем кожи у пациентов, обратившихся к участковому терапевту



• **Материал и методы**

Проведено анкетирование 120 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, обратившиеся за помощью к терапевту в ЦПМСП и за косметологической коррекцией в косметологический кабинет

Анкета включала 17 вопросов, в т. ч. по эстетическим проблемам кожи и проведенному косметологическому воздействию, наличию дерматологического заболевания, аллергических реакций у пациента и близких родственников, наличию соматических патологий, в т.ч. щитовидной железы, нарушению менструального цикла, климактерического синдрома, уровню витамина Д

Выяснили отношение к курению и количество выкуренных сигарет в день, год последнего обследования и повод его проведения

Результаты

Из 60 опрошенных женщин эстетические проблемы выявлены у 51 (85%): акне – у 4 (6,7%), постакне – у 2 (3,3%), возрастные изменения – у 43 (71,7%), купероз – у 2 (3,3%)

Косметологическому воздействию были подвержены 20 (33,3%): уход - 16 (26,7%), мезотерапия - 3 (5%), лазерная шлифовка - 1 (1,7%)

Дерматологическая патология выявлена у 15 (25%): акне- у 4 (6,7%), стригущий лишай – у 1 (16,7%), атопический дерматит – у 1 (16,7%), онихомикоз- у 3 (5%), псориаз – у 1 (1,67%), микоз стоп – у 2 (3,3%), аллергический контактный дерматит – у 2 (3,3%), опоясывающий лишай- у 1 (1,67%)

Другие заболевания были установлены у 47 (78,3%):

хронический гастрит-6 (10%), ВСД -2 (3,3%), сахарный диабет-4 (6,7%), хронический тонзиллит-1 (1,7%), гепатит С-2(3,3%), хронический колит -1 (1,67%), хронический панкреатит -3 (5%), хронический ринит- 1 (1,67%), бронхит- 1 (1,67%), миома матки-3 (5%), гипотиреоз-2 (3,3%), пиелонефрит-5 (8,3%), узловый зоб-2 (3,3%), ИБС-7 (11,7%), варикозная болезнь-1 (1,67%), лимфолейкоз-1 (1,67%)

Аллергические реакции ранее были у 13 (21,6%), в т.ч. на:

амброзию - 2 (3,3%), цитрусы-3 (5%), моющее-1 (1,67%), мед- 2 (3,3%), пух-3 (5%), лидокаин-2 (3,3%)

Экссудативный диатез в семейном анамнезе был установлен у 2 женщин (3,3%), атопический дерматит - у 8 (13,3%), полиноз - у 2 (3,3%), слезотечение не выявлено ни у одной опрошенной пациентки, бронхиальная астма - у 13 (21,6%).


Количество курящих пациенток - 9 (15%)



Год последнего обследования опрошенных пациенток:

- 2010г.- 1 (1,67%)
- 2015г.-3 (5%)
- 2018г.-2 (3,3%)
- 2019г.-1 (1,67%)
- 2020г.-3 (5%)
- 2021г.-10 (16,7%)
- 2022г.-10 (16,7%)
- 2023- 30(50%)





Содержание витамина Д в норме было у 6 (10%), ниже нормы - у 3 (5%), не обследована - 51 85%)

Щитовидная железа в норме была у 13 (21,7%), изменена - у 4 (6,7%), не обследована у 43 (71,6%)

Нарушения менструального цикла было у 1 (1,67%)

Климакс был установлен у 30 (50%)

Выводы

Полученные данные могут быть использованы при планировании оздоровительных программ женщин различного возраста



Спасибо за внимание!

