

Донецкий государственный медицинский университет
им. М. Горького
Кафедра общей стоматологии ФНМФО

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОРАЛЬНОГО ГАЛИТОЗА

Максютенко С.И., зав. кафедрой общей
стоматологии ФНМФО

Трофимец Е. К., доцент кафедры общей
стоматологии ФНМФО

ОРАЛЬНЫЙ ГАЛИТОЗ

Хроническое состояние, характеризующееся наличием неприятного запаха из полости рта, которое с трудом устраняется с помощью индивидуальных средств гигиены на короткий промежуток времени



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОРАЛЬНОГО ГАЛИТОЗА

- США – 30%
- Европа – 50-65%
- Россия – 30-50%

В США 50% стоматологов сообщают, что еженедельно к ним обращаются 6-7 пациентов с жалобами на неприятный запах изо рта (2014 г.)

Продажа потребительских товаров, предназначенных для дезодорирования полости рта, составляет бизнес с годовым оборотом в четыре миллиарда долларов

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

- Галитоз может служить индикатором патологии органов и систем
- Галитоз оказывает негативное влияние на социальную жизнь

КЛАССИФИКАЦИЯ



ПСЕВДОГАЛИТОЗ

Наличие едва уловимого, практически не различимого запаха, который воспринимается пациентом как значительный



ГАЛИТОФОБИЯ

отсутствие неприятного оттенка в запахе выдыхаемого воздуха при стойкой убежденности пациента в обратном



ИСТИННЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ГАЛИТОЗ

Прием пищи, содержащей, например, соединения серы (лук, чеснок). Попав в пищеварительную систему, эти соединения попадают в кровоток, затем в лёгкие. Из лёгких они вновь частично удаляются с выдыхаемым воздухом. Носит временный характер.




ИСТИННЫЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГАЛИТОЗ

Может быть как орального (причина скрывается непосредственно в полости рта), так и экстраорального генеза (одно из проявлений различных соматических заболеваний)



ЭТИОЛОГИЯ ГАЛИТОЗА



ЭТИОЛОГИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: местные факторы


- Употребление продуктов, содержащих соединения серы (лук, чеснок)
- Специфические диеты (продукты, богатые белками)
- Табакокурение
- Прием алкогольных, газированных напитков
- Лекарственные препараты



ЭТИОЛОГИЯ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: общие факторы

- Усиленное потоотделение
- Mensis
- Запор
- Голодание
- Ротовое дыхание
- Диета



ЭТИОЛОГИЯ

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: местные факторы

- Кариес
- Неудовлетворительная гигиена полости рта
- Гингивит
- Периодонтит
- Наличие патологических зубодесневых карманов
- Заболевания слюнных желез
- Ксеростомия
- Ротовой тип дыхания
- Кандидоз
- Некачественные ортопедические и ортодонтические конструкции



ЭТИОЛОГИЯ

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: общие факторы

ЛОР- патология



- Обструкция, инородное тело
- Искривление носовой перегородки
- Ринит, синусит
- Тонзиллит
- Ларингит
- Фарингит, дисфагия
- Застой, инфекция
- Новообразования



ЭТИОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: общие факторы


Бронхо-легочная патология

- Бронхит
- Бронхоэктазы
- Абсцесс легкого
- Плеврит
- Пневмония
- Опухоль



ЭТИОЛОГИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГАЛИТОЗА: общие факторы

- Нарушение метаболизма
- Гастрит
- Гепатит
- Нефрит
- Панкреатит
- Сахарный диабет
- Анорексия/ булимия
- Дефицит IgA
- Ксеростомия (б-нь Sjogrens, лучевая терапия, стресс)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!