

ФГ БОУ ВО Дон ГМУ МЗ России
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ФНМФО

Эстетические маски сифилиса

доц. Тахташов И. Р.

**г.Донецк
24.05.2024 г.**

Сифилис – инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (*Treponema pallidum*), передающееся преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи, в том числе и открытых или «эстетических» участков, слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, отличающееся стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением.

В течении болезни принято выделять 4 периода:

- инкубационный период;
- сифилис первичный;
- сифилис вторичный;
- сифилис третичный.

Сифилис на лице проявляется в виде твердого шанкра при первичном, пятнистой, папулезной, везикулезной, и пустулезной сыпи при вторичном, в виде гумм и гуммозной инфильтрации при третичном периоде заболевания.

Высыпания при первичном сифилисе

Первичный аффект - сифилитическая эрозия или язва - овальной или округлой формы, правильных очертаний, с четкими краями и блюдцеобразно углубленным дном. Дно чистое с плотным инфильтратом в основании, отделяемое скудное, серозное.

Высыпания при первичном сифилисе (продолжение)



Рис.1-2. Твердый шанкр на губах

Высыпания при вторичном сифилисе

Пятнистый (розеолезный) сифилид - наиболее частое поражение кожи в начале вторичного периода сифилиса. Округлые пятна размером до 1 см, не склонные к слиянию, ярко-розового, затем более бледного цвета, исчезают при надавливании. появляется постепенно, симметрично локализуется на туловище, груди, животе и сгибательных сторонах конечностей. крайне редко - на лице, волосистой части головы, ладонях, подошвах.

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)

Узелковый (папулезный) сифилид - округлой формы, с четкими границами, плотная на ощупь, поверхность гладкая; давление на центр узелка тупым зондом вызывает резкую болезненность (так называемый симптом Ядассона). В дальнейшем в центре папулы появляется шелушение, которое постепенно распространяется по периферии, образуя краевое шелушение (так называемый "воротничок Биетта").

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)



Рис.3-4. Папулезный сифилид на ладонях

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)



Рис.5. папулезный сифилид

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)

Пустулезный (гнойничковый) сифилид - редкая разновидность сифилидов, у лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, иммунодефицитом, либо алкогольной или наркотической зависимостью. Появление пустулезных сифилидов сопровождается нередко тяжелым лихорадочным состоянием.

Характерным является наличие мощного специфического инфильтрата в основании элементов.

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)

Сифилитическая алопеция (плешивость)

- мелкоочаговая - выпадают не все волосы. Картина "меха, побитого молью". На волосистой части головы очаги неправильно округлой формы диаметром 1-1,5 см, расположены беспорядочно и не сливающиеся, рисунок кожи сохранен. Очаги можно наблюдать в области бороды, усов, лобка, на бровях (признак Фурнье) и ресницах (признак Пинкуса);
- диффузная - равномерное выпадение волос по всей волосистой части головы;
- смешанная - наличие у одного больного как мелкоочагового, так и диффузного облысения.

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)



Рис.6-7. Сифилитическая алопеция

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)



Рис.8-9. Сифилитическая алопеция на бровях (признак Фурнье) и ресницах (признак Пинкуса);

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)

Пигментный сифилид (сифилитическая лейкодерма) - нарушение пигментации кожи при появлении на коже гипопигментированных пятен на гиперпигментированном фоне.

Сифилитическая лейкодерма чаще расположена на задней и боковой поверхности шеи в виде ожерелья (так называемое "ожерелье Венеры").

Высыпания при вторичном сифилисе (продолжение)



Рис.10. Пигментный сифилид (сифилитическая лейкодерма)

Высыпания при третичном сифилисе

При **третичном сифилисе** наблюдаются

- бугорковый сифилид (поверхностный узловатый сифилид) - дермальные бугорковые элементы;
- гуммы (глубокий узловатый сифилид или подкожная гумма) - гиподермальные узлы.

Очень редким признаком третичного сифилиса является третичная эритема (так называемая розеола третичная Фурнье).

Высыпания при третичном сифилисе (продолжение)



Рис.11. Гуммозный сифилид

Высыпания при третичном сифилисе (продолжение)



Рис.12. Гуммозный сифилид

Выводы

Таким образом, при сифилисе отмечается поражения открытых или «эстетических» участков тела, имеющие свои особенности в зависимости от стадии заболевания.

Благодарю за внимание