

ФГБОУ ВО ДОН ГМУ МЗ РОССИИ
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ФНМФО

Поражение кожи при позднем сифилисе

доц. Тахташов И. Р.

г.Донецк
9.10.2024 г.

Сифилис – инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (*Treponema pallidum*), передающееся преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи, слизистых оболочек, нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, отличающееся стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением.

Сифилитическая инфекция может поражать любой орган и любую систему. При висцеральном сифилисе поражаются внутренние органы пациента. При этом каких-либо специфических симптомов поражения кожи, характерных только для этой инфекции не определяется.

Специфические симптомы поражения кожи, характерных только для поздних форм этой инфекции определяются на третичной стадии заболевания.

Клинические проявления третичного сифилиса на коже и слизистых

- бугорковый сифилид
- гуммозный сифилид
- поздняя третичная розеола Фурнье

Бугорковый сифилид

В толще дермы прощупывается четко контурируемые, полушаровидные, плотные, бесполостные образования размером до горошины или косточки вишни без признаков острого воспаления (цвет от тёмно-красного до синюшного), поверхность гладкая, блестящая.

Бугорок располагается на различной глубине, над кожей возвышается обычно четверть его объема.

Клинические варианты бугорковых сифилидов:

Различают следующие клинические варианты бугорковых сифилидов:

- сгруппированный бугорковый сифилид
- бугорковый сифилид площадкой
- серпигинирующий бугорковый сифилид
- вегетирующий бугорковых сифилид
- карликовый бугорковый сифилид

Регресс бугорковых сифилидов

- размягчение с последующим рассасыванием, уплощением до уровня кожи и формированием гиперпигментированной рубцовой атрофии с тонкопластинчатым шелушением.

- размягчение с последующим некрозом и образованием язвы округлой формы с чёткими границами.

Некротический стержень превращается в корку с дальнейшим формированием рубца. Из-за разной глубины язв развиваются пёстрые "мозаичные" рубцы.

Гуммозный сифилид

Первичный морфологический элемент – узел, возникающий в подкожно-жировой клетчатке величиной с кедровый орех, плотной консистенции, безболезненный, не спаянный с окружающей тканью и потому легко смещаемый, без воспалительных явлений

Гуммозный сифилид

Первоначально кожа над ним не изменена.

С увеличением в размерах она спаивается с кожей и окружающей тканью, кожа приобретает буроватый или тёмно-красный цвет. В результате размягчения появляется флюктуация, гумма вскрывается с образованием отверстия, из которого выделяется липкая, полупрозрачная жидкость (напоминает клей или резину - "гумми арабикум").

Клинические разновидности гumm

- изолированной гummы.
- околоуставные узловатости или фиброзные гummы
- гummозные инфильтраты

Поздняя третичная розеола Фурнье

Проявление третичного сифилиса, имеющее вид розового кольца, диаметром 5-10 см, после разрешения оставляющая лёгкую рубцовую атрофию

Высыпания при третичном сифилисе



Рис. 1. Гуммозный сифилид

Высыпания при третичном сифилисе



Рис.2. Гуммозный сифилид

Благодарю за внимание