



Кафедра педиатрии №1

БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ,
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ,
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА –
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ

ДОЦЕНТ ОСТРОВСКИЙ И.М.

Введение

- ▶ Несмотря на многочисленные материалы на эту тему, для многих педиатров постановка диагноза бронхиальная астма (БА) представляется невозможным на первом уровне, и наоборот, диагноз острый обструктивный бронхит (ООБ) выставляют где надо и не надо, а правильный диагноз очень важен при ретроспективном анализе анамнеза.

Введение

- ▶ Также вызывает сложность выявление бронхообструктивного синдрома (БОС), а без этого диагностики ООБ и БА невозможны.

БОС

Итак, БОС.

Напомню три составляющих
бронхиальной обструкции:

- ▶ отёк,
- ▶ гиперсекреция слизи
- ▶ спазм.

БОС

Из всей совокупности признаков при БОС должны, соответственно, присутствовать три: диффузные хрипы в легких (у детей раннего возраста -чаще влажные, у старших – сухие); затрудненный выдох и дистанционные хрипы.

БОС

- ▶ Многие (при ошибочной постановке диагноза) пренебрегают последним признаком, а его присутствие отличает, например, ОБ от простого. В силу анатомических особенностей в младшем возрасте (до 4 лет) преобладают первые два механизма.

ООБ

Именно анатомические особенности позволяют считать БОС на фоне ОРВИ у детей раннего возраста проявлением ООБ , а не БА. Повторный ООБ делает ребенка угрожаемым по БА, а повторяющийся чаще трех раз в году уже должен рассматриваться как астма.

ООБ и БА

Если ребенок старше 4 лет реагирует на ОРВИ развитием БОС – это тоже БА. Впрочем, иногда в возрасте 5 и даже 6 лет дети с задержкой формирования легких могут реагировать на ОРВИ по механизму детей раннего возраста, в этом случае у них выслушиваются в легких диффузные влажные хрипы. Только в этом случае в этом возрасте возможен диагноз ООБ.

ООБ

Из предыдущего абзаца понятно, что ООБ, как и другие острые бронхиты – это осложнение ОРВИ, отсутствие которой у детей раннего возраста требует поиска другой причины БОС.

Выводы

- ▶ БОС - это диффузные хрипы, затруднённый выдох и дистанционные хрипы
- ▶ ООБ – это БОС на фоне ОРВИ у детей до 4 лет не чаще 3 раз в году.
- ▶ Во всех других случаях (после исключения других причин БОС) – это БА