

Патология репродуктивной сферы при поздних акне у женщин

Докладчик:

Лукьянченко Елена Николаевна

**к.мед.н., доц.,доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО**

Главный врач центра медицинской косметологии Global Medical Group

Распределение сопутствующей патологии у пациенток с поздними акне

- При анализе сопутствующей патологии у 60 больных с поздними акне, находящихся под наблюдением, отмечено, что во всех возрастных группах с различной частотой встречалась патология желудочно-кишечного тракта, в т.ч.
 - гастриты
 - холециститы
 - дискинезия желчевыводящих путей
 - патология кишечника
 - щитовидной железы
 - моче-выделительной системы
 - заболевания сердечно -сосудистой системы
 - болезни бронхо-легочной системы
 - заболевания надпочечников

Распределение сопутствующей патологии у пациенток с поздними акне

При ПА наблюдались:

- хронические гастриты и патология кишечника - у 9 (15%) и 10 (16,67%)
- холецистит - у 4 (13,3%)
- дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) – у 15 (25%) больных


Распределение сопутствующей патологии у пациенток с поздними акне

- Патология щитовидной железы встречалась у 15 (25%) больных с ПА
- Заболевания бронхолегочной системы – у 2 (3,33%)
- Патология мочевыделительной системы – у 7 (11,67%)

Распределение сопутствующей патологии у пациенток с акне

| Сопутствующая патология | Всего | | Ранние акне | | Поздние акне | |
|--|------------|--------|-------------|-------|--------------|--------|
| | Абс. число | % | Абс. число | % | Абс. число | % |
| Желудочно-кишечный тракт: | 27 | 30% | 18 | 60% | 9 | 15% |
| хронический гастрит | 12 | 13,3% | 4 | 13,3% | 8 | 13,3% |
| холецистит | 36 | 40% | 16 | 53,3% | 20 | 33,3% |
| ДЖВП | 24 | 26,7% | 14 | 46,6% | 10 | 16,67% |
| патология кишечника | | | | | | % |
| Щитовидная железа | 33 | 36,67% | 18 | 60% | 15 | 25% |
| Мочевыделительная система | 11 | 12,2% | 4 | 13,3% | 7 | 11,67% |
| Бронхо -легочная система | 5 | 5,55% | 3 | 10% | 2 | 3,33% |
| Сердечно-сосудистая система | 7 | 7,77% | 0 | 0 | 7 | 11,67% |
| Гипоталамо-гипофизарный надпочечниковый синдром | 3 | 3,33% | 0 | 0 | 3 | 5% |


Структура экстрагенитальной патологии в обследованных группах при акне



Патология органов репродуктивной сферы у больных с ПА

- фибромиома матки была у 35(58,3%) пациенток
- поликистоз яичников - у 28 (46,6%)
- нарушения менструального цикла - у 15 (25%) больных
- полипы шейки матки – у 5 (8,33 %)
- эндометриоз –у 4 (6,66%)

Патология органов репродуктивной сферы у больных с ПА



ВЫВОДЫ

- Таким образом, проведенные исследования выявили особенности клинических проявлений при ПА в зависимости от наличия коморбидной патологии, что необходимо учитывать при планировании лечебно-диагностических и реабилитационных программ.

Мои контакты:

+79493591264

lenatravel@mail.ru

Благодарю за внимание!